傷寒明理續論

殺車槌法

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



傷寒明理續論

陶華述

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

明理續論序

昔朱肱奉議著傷寒百問。嘗成經進。授醫博士。其書付監刊行。道遇豫章名醫宋道方。因就質之。宋爲指駁數十條。肱罔然自失。由是書監不刊。事見續易簡方雙鍾。李知先又爲歌括八韻二書。吾鄉先輩例以爲活人之書。按魏志佗傳云。出書一卷。此書可以活人。則活人之名所由始。而仲景傷寒論是也。朱李二公雖知有仲景之書。不能臻其閫奧。未足以充活人之名。正統改元。余遊京師。遇臨江劉志善先生。授書一卷。指摘百問亦數十條。攜以南歸。呈之松江趙景元先生。奉議之書。固未盡善。而劉公所駁似爲大察。前人無議爲也。且仲景之書流傳既久。魚魯實多。微辭奧旨之互見。殘簡斷篇之後先。朱公既未知其文。又不知其證候。然自漢魏以來。高人逸士所著。不傳于今者。何可勝數。因出示諸書。曰郭白雲傷寒補亡。龐安常卒病論。韓祇和微旨。楊仁齋傷寒類書。王實證治。常器之楊大授。凡此數種。皆有功于仲景。而東南醫流所未見也。景元亦自編一書。曰傷寒類例。久未之成。不以示人。庚寅冬。予病足。不出戶庭數月。因觀成無己明理論。止五十證。辨究詳明。惜其未備。於是乃集所見所聞。比類附例。斟酌而損益之。遂成一書。名曰明理續論。姑以自備遺亡。非敢傳諸人也。雖朱公百問積平生之勤。尙不免後人之紛紜言之。予實何人。乃以數月而有所成。蓋賴古人之成訓。有以啓發之。初學醫之士。或有所得焉。當有知予心者。乃記其所由於卷首云。

傷寒明理續論

明　餘杭節菴陶華述

傷寒三陰三陽脈證論

傷寒汗下溫之法。最不可輕。據脈以驗證。問證而對脈。太陽者、陽證之表也。陽明者、陽證之裏也。少陽者、三陽三陰之間。太陰、少陰、厥陰、又居於裏。總謂之陰證也。發于外則太陽爲之首。發于內則少陰爲之先。太陽惡寒而少陰亦惡寒。但太陽之脈多浮。少陰之脈沉細。與其他證狀亦自異也。發熱惡寒身體疼痛或自汗。或無汗。是爲表證。可汗。不惡寒。反惡熱。口燥咽乾。壯熱。腹滿。小便如常。而大便祕結。是爲裏證。可下。厥冷囊縮自利煩燥而無身熱頭疼。是爲陰證。可溫。浮洪緊數。此表病之脈。沉實滑數。此裏病之脈。微細緩若。此陰病之脈。在表者、邪傳於榮衞之間。在裏者、邪入于胃腑之內。胃腑之下。少陽居焉。若傳之陰則爲邪氣入臟矣。榮與衞俱爲表也。亦均可汗也。然有汗者爲傷風。風傷衞氣。則以桂枝助陽而汗之。輕無汗者爲傷寒。寒傷榮氣。則以麻黃湯助陽而汗之。重榮衞固爲表也。胃腑亦可以爲表也。然以腑臟而分表裏。則在腑爲之表。在臟爲之裏。胃取諸腑。可以表言。若合榮衞腑臟而分之。則表者榮衞之所行。裏者胃腑之所主。而臟則又深于裏者矣。審脈問證。辯明定經。眞知其爲表邪則汗之。眞知其爲裏邪則下之。眞知其爲陰證則溫之。表有邪則爲陽虛。陰經受邪則爲臟病。而溫裏之藥。熱如此而汗。如彼而下。又如彼而溫。桂枝承氣、投之不差。姜附理中。發而必中。大抵治傷寒有法。投劑少差。死生立見。古人處方立

論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知奇者若網在綱有條不紊論至于此則知古人之立論甚嚴而汗下溫之法亦不可輕也信矣經曰傷寒六七日目中不了了無表證脈雖浮亦有可下者少陰病二三日無裏證亦有可汗者陰證四逆法當用溫而四逆散性寒豈可用哉曰醫在九流之中非圓機之士不足爲語也脈雖浮而亦可下者無表證謂六七日不大便借使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者少陰本無熱反發熱而表猶未解故用溫藥微取其汗也借使身不發熱其敢輕汗之乎四逆湯用姜附四逆散用枳柴一寒一熱病主四逆固不侔矣然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同四逆散用藥寒主先陽後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也若張氏之論日數多則曰日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數雖少若有裏證而脈沉實者卽須下之此日數之不可拘也至如陽極發厥陰極發燥陰證似陽陽證似陰差之毫釐繆以千里可不深思而熟慮也哉

陰陽虛實用藥寒溫辯

傷寒一書所謂陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛實出者爲虛入者爲實蓋表之眞陽旣虛故陰邪以盛出而乘陽是以脈浮于外其病在表法當汗之當其陰邪出表脈浮于外之時不可自惑以爲陽脈盛也裏之眞陰旣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脈入于內其病在裏法當下之當其陽邪入裏脈實于內之時不可自惑以爲陰脈盛也是說非古人之立言也蓋使人知如此之爲陰

盛則抑陰而助陽。如彼之爲陽盛。則抑陽而助陰。陰甚則邪出於外者。發表之藥。當性溫以助陽氣。如桂枝湯之類是也。陽盛則邪入于內者。攻裏之藥。當性寒以抑陽氣。如承氣湯之類是也。或曰。陰出而乘于外。是陽之不足也。陽病則當有以發表而汗之。何哉。是大不然。陰邪傳于外。不汗之則邪何由而去。桂枝之性溫。溫之乃所以助陽。陽有所助而長。則陰邪之所由以消。辛甘發散爲陽者此也。張氏所謂承氣入胃陰盛乃亡者。正恐陰盛出外而誤以承氣下之。安得而不亡。或者有陽入而承于內。是陰之不足也。陰病則當有以溫養而下之。何哉。是又不然。陽邪入于內。不下之則邪從何而出。承氣之性寒。寒之乃所以抑陽。陽受其抑則微。而眞陰之所由以長。酸苦湧泄爲陰者此也。張氏所謂桂枝下咽陽盛則斃。正恐陽盛入內而誤以桂枝汗之。又安得而不死。觀古人發表之藥多溫。攻裏之藥多寒。則知陰陽虛實之意微。非止於汗下設矣。所以爲用藥寒溫設也。

六經用藥格法

太陽屬膀胱寒水。非發汗不能愈。亦有桂枝麻黃以助陽祛邪。此膀胱寒水之經。有標本之作。風寒初客仍在表。宜用辛溫之劑以發散之。若無頭痛惡寒。或非冬時。皆不可用。

陽明屬胃。非通泄不能瘥。必用大黃芒硝以疎利陽熱。此言表證已罷。頭痛惡寒已除。則熱歸陽明之本矣。宜承氣湯寒劑以泄熱。若惡寒未除。則爲表寒邪尚在。不可下也。冬時亦宜用。不可拘忌。

少陽屬膽。無出入之道。柴胡半夏能利能汗。消解血熱。黃芩佐之。

太陰脾土。惟惡寒濕。非乾姜、白朮、不能燥濕也。
少陰腎水。惟惡寒燥。非附子不能溫潤。
厥陰肝木。藏血榮筋。非芍藥甘草、不能滋養。此用藥經常之道也。

陰陽虛盛用藥寒溫辯

夫傷寒發表攻裏之藥。寒熱殊途。用之一差。死生反掌。所以越人、仲景、深致意於其間也。難經云。傷寒陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈。且寒邪之傷人也。有淺深焉。淺者汗之。深者下之。此古今不易之定法也。方其風寒初客皮毛之間。陰氣乃盛。閉塞腠理。身中陽氣已虛。不能禦衛。遂有惡風惡寒之證見焉。當此之時。止宜桂枝湯辛甘溫之藥。助陽抑陰而發之。陰邪既散。表氣冲和而愈。經云。辛甘發散爲陽者是也。不知用此而反以承氣湯苦寒之藥下之。表裏俱傷。不亡何待。表邪既罷。寒作爲熱。陽陷入深而盛於裏。則津液消耗。腸胃燥澁。而臟腑之眞陰虛矣。陰氣既虛。即譫妄狂燥。煩渴惡熱之病而作也。當此之時。宜用承氣湯苦寒之劑。扶陰抑陽。而泄去熱氣。陽邪即退。胃中眞陰來復。裏氣和平而愈。內經所謂酸苦湧泄爲陰者是也。不知用此。乃以桂枝辛熱之藥助邪伐正。安有不斃者乎。所以仲景云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛乃亡。良以此夫。嗚呼。此論誠爲傷寒汗下之樞機乎。俗醫不能達此爲妙。昧于陰陽虛盛之道。悖逆此理而不殺人也幾希。經云。發表不遠熱。攻裏不遠寒。豈虛語哉。

三陰三陽脈證

經云尺寸俱浮大者陽受病也當一二日發以其脈上連風府故頭項痛腰脊強傷寒則發熱惡寒傷風則鼻塞惡風然傷風有汗傷寒無汗

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡于目故身熱目疼鼻乾不得臥又曰不惡寒而作渴皆爲在經不惡寒反惡熱自汗出大便難

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脅絡於耳故胸脅痛而耳聾口苦咽乾目眩往來寒熱而嘔此三經受病未入于腑者可汗而已

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡于嗌故腹滿而咽乾或腹痛手足溫自利不渴

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡于肺繫舌本故口燥舌乾而渴惡寒口中和默默欲寐時時腹痛又咽痛三證

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡于肝故煩滿而囊縮唇青舌捲筋急或渴不欲食卽吐蚘此三經皆受病也已入於腑者可下而已此皆自陽經傳來者故宜下而去之非若陰經自中之寒此則爲眞陰證矣當用四逆湯輩溫之

汗下溫正法

太陽傷風自汗惡風。桂枝湯。傷寒無汗惡寒。麻黃湯。陽明不惡寒反惡熱自汗者、大便難。大柴胡湯、小承氣湯。汗不止者胃汁乾。急下之。大承氣湯。無汗惡寒。升麻葛根湯。有汗脈遲微惡寒。爲表未解。桂枝湯。無汗脈浮而喘。麻黃湯。

少陽證病。屬小柴胡湯。

太陰自利不渴爲臟寒。理中湯、四逆湯。胸中脹滿。枳實理中丸。脹滿脈浮。桂枝湯。脹滿時痛。桂枝加芍藥湯。痛甚。桂枝加大黃湯。

少陰脈沉。口不乾。舌不燥。皆惡寒。小便清白。四逆湯。始得病脈。脈沉。反發熱。麻黃附子細辛湯。口燥咽乾而渴。急下之。大承氣湯。六經中惟此一經難治。大要以口燥而渴知其熱。脈沉而遲別其寒。

厥陰脈微浮爲欲愈。不浮爲未愈。小建中湯。脈浮緩如瘧狀。桂枝麻黃各半湯。脈沉短者囊必縮。爲毒氣入臟。承氣湯下之。利不止者。四逆湯。

傷風見寒傷寒見風脈證

熱盛而煩。手足自溫。脈浮而緊。此傷風見寒脈也。不煩少熱。四肢微厥。脈浮而緩。此傷寒見風脈也。二者爲榮衞俱病。法用大青龍湯。然不可輕用。須風寒俱盛。又加煩燥。方可與之。一法以桂枝麻黃湯尤穩。今改羌活湯。

三陽合病

本太陽病。若汗若下若利。小便無津液。胃中燥。轉屬陽明。是爲脾約。若惡寒。用升麻葛根。不惡寒反惡熱。大便難。白虎湯證語者。調胃承氣湯。下之喘而胸滿者。不可下。麻黃湯。太陽少陽。頭項強急。脅下硬滿。目眩。往來寒熱。小柴胡湯。

少陽陽明。本少陽病。因爲發汗利小便。後胃中燥。大便難。屬調胃承氣湯。

正陽陽明。乃本經風盛氣實也。大柴胡湯。大小承氣湯。選用之。

三陽合病。腹滿、身重、譫語、遺尿、口中不仁。屬白虎湯。口乾、舌燥、不仁、背惡寒。同太陽陽明。少陽陽明、正陽陽明、無表證者。俱可下。惟惡寒者。爲太陽陽明合病。未過經。爲屬表。可發汗。桂枝麻黃各半湯。蓋在經則汗。過經則下也。

太陽陽明併病

本太陽病發汗則汗出不徹。因轉出陽明。續自微汗出。不惡寒。是併歸陽明也。

太陽證尚在。桂枝麻黃各半湯。太陽證也。大小承氣湯。陽明證也。

春溫變熱

溫熱病者。冬時感寒。偶不卽發。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。夏變爲暑病。暑病者。熱又甚於溫也。溫病發於春三月夏至前是也。發熱、咳嗽、頭疼、身痛、口燥渴、脈浮弦、熱甚者。小柴胡湯。熱微者。升麻葛根湯、解肌湯。微熱不渴。小柴胡加桂枝。渴者加五味。渴者去半夏加括蔞人參。脈實煩渴者。大柴胡湯。微利之。以

其脈實。必大便難也。虛煩者。竹葉石膏湯。然用羌活湯解之爲當。渴加知母、石膏。夏月熱病。發熱、頭疼、身體痛重、不惡寒而惡熱。其脈洪。不可溫。宜羌活湯。渴加知母、石膏。三月至夏。謂之晚發。梔子升麻湯。有少陽證者。小柴胡湯。更于前方內選用。若春夏有惡風惡寒類傷寒證者。蓋當時暴中風寒之氣。新病卽非冬時受寒。通用羌活湯治之。

痓

痓者、先太陽中風。重感寒溫所致。經曰。身熱、足寒、頸項強急、惡寒、時時頭熱、面赤、目赤、獨頭面搖、卒口噤、背反張者。痓病也。桂枝加括蔞湯主之。傷風頭痛。常自汗出而嘔者。若汗之必發痓。大發濕家汗亦作痓。新產血虛。汗出傷風亦作痓。若其脈沉弦而遲。或帶緊。或散于指外。皆惡候也。發熱無汗惡寒爲剛痓。葛根湯。或麻黃葛根湯。發熱有汗不惡寒爲柔痓。桂枝加葛根湯、桂枝括蔞葛根湯。二痓通用小續命湯。剛痓爲陽。去附子。柔痓爲陰。去麻黃。剛痓胸滿、口噤、咬牙、脚攣、臥不着席。大承氣湯下之。柔痓桂心白朮湯、附子防風湯、白朮散、桂枝羌散、選用。

風溫濕溫

風溫尺寸俱浮。素傷於風。因而傷熱。風與熱搏。卽爲風溫。其外證。四肢不收、身熱、自汗、頭疼、喘息、發渴、昏睡。或體重不仁。愼勿發汗。汗之則譫語煩燥。目無精彩。病在少陰厥陰二經。葳蕤湯、人參敗毒散、葛根龍膽湯、小柴胡湯、選用。未醒者。柴胡桂枝湯。

發汗已。身灼熱。知母葛根湯。渴甚。括蔞根湯。脈浮、身重、汗出。漢防己湯。誤汗風溫。防己黃耆湯。

濕溫寸濡而弱。尺小而急。素傷於濕。因而中暑。濕與熱搏。卽爲濕溫。其狀胸腹滿、目痛、壯熱、妄言、自汗、兩脛逆冷。攣急、惡寒。若發其汗。使人不能言。耳聾不知痛處。其身青而色變。醫殺之耳。

濕溫太陽經。用白虎蒼朮湯加桂枝。濕勝則一身盡痛。發熱、身黃、小便不利、大便反快。五苓散加芎陳。臟腑虛自利甚。理中湯、朮附湯。

風濕中濕

風濕脈浮。先傷濕而後傷風也。其證肢體腫痛。不能轉側。額上微汗。惡寒不欲去衣。大便難。小便利。熱至日晡西而劇。治法。但微解肌。若正發汗。則風去濕在。非徒無益而又害之。解肌用麻黃、杏子、薏苡、甘草湯。白朮防己黃耆湯。不嘔不渴、脈浮虛者。桂枝附子湯。濕多身痛。小便自利。甘草附子湯。煩渴。小便不利。五苓散。外不熱、內不渴。小便自利。朮附湯緩。若昏迷腹滿。身重、自汗、失音、下利不禁。白通湯加白朮去甘草。身腫痛、微喘、惡風、杏仁湯、人參敗毒散、通用。熱而煩渴者。加括蔞。若誤下之。小便必不利。可五苓散中濕小便不利。大便自利。甘草附子湯。五苓散。大小便皆利。則與朮附湯。身體痛或鼻塞。小建中湯加黃耆。

溫毒中暍

溫毒者。冬月感寒毒異氣。至春始發也。表證未罷。毒氣不散。故有發斑之證。心下煩悶。嘔逆咳嗽。後必下利。寸脈洪數。尺脈實大。爲病則重。以陽氣盛故耳。治法。通用玄參升麻湯。黑膏主之。詳見發斑條中。

中暑脈虛而伏。身熱、背惡寒、面垢、自汗、煩燥、大渴。毛聳惡寒、昏昏倦怠、而身不痛。與傷寒諸證不同矣。內外俱熱、口燥煩渴、四肢微冷、而身不痛。用白虎湯。痰逆惡寒。橘皮湯。熱悶不惡寒。竹葉石膏湯。頭痛、惡心煩燥、心下不快、小便不利。五苓散。下消暑丸。中暑用小柴胡湯最良。脈芤遲、腠理開、灑然毛聳、口齒燥。白虎加人參湯。霍亂煩燥、大渴腹痛、四肢冷、脚轉筋。以黃連香薷湯。

發熱

夫翕翕然而熱者、表熱也。有蒸蒸而熱者、裏熱也。其屬表者。風寒客於皮膚。邪氣怫鬱于外。表熱而裏不熱也。其屬裏者。陽氣下陷。入於陰中。裏熱甚而達表也。其在半表半裏者。以表熱未罷。邪氣傳裏。裏未作實。則表裏俱熱。而但輕于純在裏也。太陽厥陰、皆不發熱。惟少陰反有發熱之證。或其脈沉。或下利、手足冷。爲異耳。雖然傷寒發熱。病之常也。脈陰陽俱虛、熱不止者。汗後復發熱、脈燥疾下利者。皆不易治。其可例視之乎。

太陽病。發熱、頭疼、惡寒、有汗。桂枝湯。惡寒、無汗。麻黃湯。

傷寒六七日。目中不了了。無表裏證。大便難。身微熱。此爲實。急下之。大承氣湯。脈浮數者。大柴胡湯。

陽明病。發熱、汗出、脈浮數實者。調胃承氣湯。脈浮桂枝湯。汗多者胃汁乾。急下大承氣湯。

中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入卽吐。名曰水逆。五苓散。脈浮而大。其人發熱、煩渴、小便赤、表裏俱見。五苓散。

少陽發熱。脈弦細而嘔。小柴胡湯。

少陰反發熱。有二病。脈沉者。麻黃附子細辛湯。下利厥逆、裏寒外熱、脈不出者。通脈四逆湯。

脈浮熱甚。反灸之。因火而動。必咽燥吐血。四逆湯。脈浮大遲。表熱裏寒。下利清穀。四逆湯。發熱、口乾、鼻燥、能食者。黃芩湯。

脈浮發熱、無汗而渴。表未解也。小柴胡湯加人參括蔞湯。壯熱頭痛。心中煩者。梔子黃芩湯。汗下後有熱。大汗則損氣。氣損則陽微。故脈虛而惡寒。大下則傷血。血傷則陰弱。故脈濇而發熱。誤汗、誤下。皆有此耳。且陰以陽爲主。陽以陰爲根。下之亡陰矣。陰無所主。邪氣搏之。血虛乃發熱也。

太陽病發汗。遂發熱惡寒。小柴胡湯。蒸蒸而熱者。屬胃。調胃承氣湯。

下後陰弱而發熱。是爲內熱。葶藶苦酒湯。若脈浮則汗之。麻黃湯。脈實則下之。大柴胡湯。大下後。身熱不去、心中結痛者。未欲解。梔子豉湯。發汗又復下之。惡寒發熱無休止時。小建中湯。

傷寒以圓藥下之。身熱不去。微煩者。梔子乾姜湯。

下後身熱不去、心中結痛者。梔子豉湯。瘥後勞復發熱。小柴胡湯。脈浮者。當汗解。柴胡桂枝湯。脈沉者。當下解。調胃承氣湯。

下利腹反痞滿者。生姜瀉心湯。小便不利。麥門冬湯。食復發熱。梔子豉湯。加大黃。病後虛羸、微熱不去者。竹葉石膏湯。

頭痛

大凡頭痛屬三陽。乃邪氣上攻也。太陽專主頭痛。陽明、少陽亦有之。三陰絡上不過頭。惟厥陰循喉嚨之後。上連目系頂顛。故有頭痛、乾嘔、吐涎沫之證。却無身熱。亦與陽證不同。雖然風濕在少陰。濕溫在太陰。其經從足走至胸中而還。及頭痛過於陰毒。是又不可拘也。若兩感于寒。太陽、少陰俱病。則頭痛、口乾煩滿而渴。與夫頭痛極甚。又連于胸、手足寒者。則爲眞頭痛。不可治矣。

太陽病。頭痛、發熱、惡寒、無汗。麻黃湯。有汗桂枝湯。已發汗未發汗。頭痛如破者。葛根葱白湯。

太陽病。下之脈細數者。頭痛未止。連鬚葱白湯。

陽明頭痛。不惡寒。反惡熱。六七日不大便。胃實氣攻於上也。少與調胃承氣湯。

少陽頭痛。脈弦發熱。小柴胡湯。

濕家頭痛。鼻塞。瓜蒂末納鼻中。黃水出立愈。

痰涎、頭痛、胸滿、寒熱、脈緊。瓜蒂散吐之。

厥陰頭痛。乾嘔、吐涎沫。吳茱萸湯。

頭痛、收熱、心煩。梔子黃芩湯。

天行勞復。頭痛、四肢痛。葱頭湯。

項強

項背強者、太陽表邪也。發散則解。結胸項強。有下之證。寒濕項強則成痓。見本條。臨病宜審。

太陽病項強。無汗惡風爲表實。葛根湯。項背強、發熱汗者。惡風爲表虛。桂枝加葛根。誤下。太陰結胸項強。大陷胸丸。一法。頻與理中丸。若損甚者。兼與四逆湯。項強、脅下滿、身熱、惡風、手足溫而渴。小柴胡湯。

陰毒初得病。項背強、咽痛、心腹痛、短氣、厥逆、吐利、身如被杖。附子湯。陰毒甘草湯。正陽湯。天行復作熱、至晚則腰痛、頭項強、身重。葛根生姜豉湯。

惡風

惡風者。見風則怯。密室之中無所惡也。風傷衞氣。衞虛則腠理不密。由是而惡矣。悉屬於陽。非比惡寒有陰陽之別。若無汗而惡寒者。爲傷寒。當發其汗。汗出而惡風者。則爲中風。當解其肌。不可更發汗。若裏證甚而惡風未能者。尤當先解其表。三陽風濕。皆有此證。不可不辯。

太陽中風。陽浮陰弱。惡風自汗。發熱鼻鳴乾嘔。桂枝湯。

頭痛發熱、身疼、腰痛、骨節疼、惡風無汗而喘。麻黃湯。發汗太過。衞虛亡陽。遂漏不止而惡風者。法當用溫。桂枝附子湯。

小便難。四肢微急。難以屈伸。治與上同。

若吐若下後。七八日不解。表裏俱熱。時惡風。大渴。舌乾燥而煩。白虎加人參湯。

汗不止。必惡風。煩燥不得臥。先防風白朮牡礪湯。次小建中湯。風濕惡風。不欲去衣。骨節煩疼。不得屈伸。

汗出短氣。小便不利。或身微腫。甘草附子湯。

脈浮身重。汗出惡風。防己黃耆湯。

惡寒

惡寒者。不見風亦惡寒。身雖熱。亦不欲去衣被。其風寒客于榮衞。陰氣上入陽中。則洒淅而惡寒也。經曰。發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。謂如或已發熱。或未發熱。必先惡寒而繼之以發熱。此則發於陽也。若初病惡寒而倦。脈沉細而緊。此則爲熱發於陰也。在陽則發汗。在陰則溫裏。或下證悉具而微惡寒者。是表猶未解。當先解表而後攻裏。若少陰病惡寒而倦。手足厥冷。自利。燥煩。脈不至者。又爲不治之證。

太陽病。發熱或未發熱。惡寒有汗。桂枝湯。無汗。麻黃湯。

病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。無陽也。不可發汗。越婢湯。

陽明病固宜下。微惡寒者。係與太陽合。病在經。屬表。可發汗。麻黃湯。若脈遲、汗多、微惡寒者。表未解也。雖陽明證。可桂枝湯。

少陽病。頭汗出、微惡寒。柴胡桂枝湯。

發熱。汗出後惡寒而嘔。但心下痞者。五苓散。發汗後惡寒者、虛也。芍藥附子甘草湯。

惡寒脈微而復利。正亡血也。四逆湯加人參。汗後惡寒。脈細數浮遲。嘔不止。理中丸。

大下後復發汗。心下痞而惡寒。表未解也。當先解表。桂枝湯。後攻痞。三黃瀉心湯。

太陽病。下後脈促胸滿者。桂枝去芍藥。若微惡寒者。桂枝加芍藥附子湯。

少陰病。脈沉細。惡寒者。四逆湯。

若下利惡寒而倦。手足溫者。小建中湯。若惡寒而倦。時時自煩。不欲厚衣。大柴胡湯。

亡血家不可發汗。汗之則寒慄而振。小柴胡湯、芍藥湯。

脈弱者不可發汗。汗之則寒慄不能自還。當歸四逆湯。

背惡寒

背爲陽。腹爲陰。背惡寒。陽不足也。陽不足則陰氣盛。陰氣盛者。口中和。陽氣內陷者。口乾燥。附子、白虎。宜加詳審。

口中和。背惡寒者。屬少陰。附子湯。及灸氣海。陽氣內陷、口乾燥、背惡寒。白虎湯。

寒熱

寒熱往來者。陰陽相勝。邪正相爭而作也。蓋陽不足。則陰邪出於表而與之爭。故陰勝而爲寒。陰不足。則陽邪入於裏而與之爭。故陽勝而爲熱。邪居表多則多寒。邪居裏多則多熱。邪在半表半裏。則寒熱相半。乍往乍來而間作也。小柴胡湯專主寒熱。寒多者加桂。熱多者加大黃。是大法也。

太陽病。八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。不嘔。清便自可。一日二三度發。桂枝麻黃各半湯。脈微緩者

不可汗。宜越婢湯。

病至十餘日。熱結在裏。往來寒熱。大柴胡湯。

心煩發嘔。胸膈滿。不欲食。寒熱往來。小柴胡湯。

汗下後。不嘔不渴。頭汗出。胸膈滿。小便不利。寒熱往來。柴胡桂姜湯。

熱多寒少。尺脈遲者。榮血不足。黃耆建中湯。脈浮大。寒熱往來。宜祛邪。凡婦人中風。七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。爲熱入血室。小柴胡湯。

潮熱

潮熱屬陽明。陽明旺於未申。一日一發。日晡而作也。邪入胃腑。爲可下之證。設或脈浮而緊。潮熱而利。或小便難。大便溏者。熱未入腑。猶帶表邪。先當和解其外。如小便利、大便硬。方可攻之。若潮熱於寅卯。寅卯則屬少陽。潮於巳午。則屬太陽。是又不可不辯。

病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡潮熱。脈實可下。小承氣湯。或大柴胡。脈虛者不可下。桂枝湯。

陽明病。潮熱、大便微硬者。大承氣湯。

陽明病。脈浮而緊。必潮熱。發作有時。但脈浮者。必盜汗出。柴胡桂枝湯。

腹滿不大便。潮熱。小承氣湯微利之。

似瘧

似瘧。一名瘧狀。作止有時。非若寒熱往來無定也。

太陽似瘧。脈伏洪。桂枝湯。清便自可。不嘔。一日二三度發。桂枝、麻黃各半湯。

陽明似瘧。煩熱汗出日晡發熱。脈浮。桂枝湯。脈實。承氣湯。

婦人熱入血室。其血必結。亦如瘧狀。小柴胡湯。

熱多寒少。陽乘陰也。若尺脈遲。爲血少。先以黃耆建中湯養其榮衞。脈不遲。却以小柴胡湯、桂枝二越婢湯、選用之。

厥陰脈浮緩。囊不縮。必發熱惡寒似瘧。爲欲愈。桂枝麻黃各半湯。溫瘧。其脈如平。身無寒。但熱骨節煩疼。時嘔。白虎湯加桂。渴者。柴胡加人參括蔞湯。

無汗

無汗。寒邪中經。腠理閉密。津液內滲而無汗也。若風暑濕干之。則自汗出矣。當汗之證。與麻黃湯三劑而不得汗者。此又不可療也。

太陽當熱。無汗頭痛。麻黃湯。

項背強。兀兀無汗。葛根湯。

剛痓發熱。惡寒無汗。葛根湯。或小續命湯。

脈浮。發熱無汗。表不解者。麻黃湯。汗不止。白虎湯。

渴欲飲水。無表證者。白虎加人參。陽明反無汗。脈浮而喘者。麻黃湯。若無汗。小便不利。心中懊憹。身必發黃。五苓散加茵陳。

自汗

衛氣者。所以肥腠理而固津液者也。衛爲邪所干。不能衛護於外。由是而汗出焉。且自汗者、有表裏虛實之分。若自汗出。惡風寒。爲表未解。當解肌以致汗泄。惡風與汗後惡寒。皆爲表虛。必用溫劑。若汗出不惡風寒。則爲表解裏未和。從下之。設或汗出髮潤。如油如珠。凝而不流。皆不可治也。

太陽中風。自汗。脈浮緩。桂枝湯。

汗出而渴。小便難。五苓散。不渴者。茯苓甘草湯。

自汗出。小便難。而用桂枝。惟加芍藥甘草。

自汗出。小便不數。心煩微惡寒。脚攣急。桂枝附子。

陽明汗多而渴。發熱譫語。大便硬。調胃承氣湯。

太陽病發汗。遂漏不止。惡風寒。桂枝附子湯。

若小便自利而汗出。爲津液少。不可攻利。宜蜜導煎通之。若汗多者胃汁乾。急下之。大承氣湯。

汗多而渴。勿用五苓散。

汗不止無他證者。溫粉撲之。服桂枝湯。大汗出。煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參。

下後。不可更用桂枝湯。

若汗而喘、無大熱者。麻黃杏仁甘草石膏湯。

諸陽經絡循於頭。三陰則至項而還。頭汗者。邪搏諸陽。則汗見於頭也。若遍身汗者。爲之熱越。令熱不得越而陽氣上騰。津液上腠。故但頭汗耳。夫表虛則不可下。內涸則不宜汗。頭汗之證。更不可再汗也。其或瘀血在裏。與夫熱入血室。虛煩水結。皆令頭汗。此爲熱鬱於內而上達。或吐或下。以去其邪。設或小便不利。內外關格而頭汗。則爲陽脫。誤下濕家額上汗出而喘。小便難。小便利。亦爲陽脫。二者皆不療矣。百問表實裏虛。故頭汗不可下。發黃頭汗。及項而止。小便難。引水漿。此濕也。茵陳蒿、茵陳五苓散。

心結胸。心悸滿。無大熱。頭汗出。半夏茯苓湯。

譫語頭汗。是爲血熱。屬陽明。用承氣湯。若心中懊憹而頭汗者。梔子豉湯。

半表半裏有柴胡證。並小柴胡湯。熱寒往來。微惡寒。爲表。脅下滿。大便堅。爲裏。

手足汗

四肢者、諸陽之本。熱聚於胃。則津液傍達于手足也。蘊熱則燥煩譫語。挾寒則水穀不分。是又承氣、理中之不同。

陽明病。手足濈濈汗出。譫語。大便難。與承氣湯。

陽明中寒。不能食。小便不利。手足汗出。大便初硬後溏。水穀不分。與理中湯。一法用猪苓湯。

盜汗

盜汗者、睡着則汗出、覺則便不出矣、雜病責於陽虛、傷寒責在半表半裏、故知膽有熱也、陽明病、脈浮緊、潮熱、盜汗、柴胡桂枝湯、脈浮大、欲眠目合則汗、小柴胡湯、又柴胡桂枝湯、

煩熱

邪熱傳裏、不經發汗吐下、則爲煩熱、與發熱似同而異、經曰、病人發熱、汗出則解、如未作牖熱、但當和解微熱而已、若心下滿而煩、則有吐下之異、宜別其證之虛實而爲劑之輕重也、先煩而悸者爲實、先悸而煩者爲虛、虛煩而心中欲嘔吐欝悶之狀、太陽病、心煩自汗、小便數者、不可與桂枝湯、宜芍藥甘草湯、服桂枝湯後、出汗後煩渴者、脈洪大、白虎加人參湯、陽明病、心煩喜嘔、壯熱往來、心下悸、小便不利、小柴胡湯、加茯苓、傷寒二三日、心中悸而煩、小建中湯、發汗後、解半日許復煩、脈浮數者、可更發汗、桂枝湯、呕而煩渴者、飲則吐水、五苓散、不愈、竹葉石膏湯、下後、晝煩夜靜、不渴不嘔、無表證、脈微沉、乾姜附子湯、若懊憹、與梔子豆豉湯、若發汗、若下之、病仍不解而煩燥者、茯苓四逆、大下後、六七日不大便、不解、腹滿痛者、有燥屎、大承氣湯、吐汗下後、虛煩、心下痞滿、氣上衝胸、頭眩、身爲振搖、茯苓桂枝白朮甘草湯、

腎傷寒表裏無熱。但煩憒。不欲見光明。有時腹痛。其脈沉細。四逆湯。

煩燥

煩爲擾亂而燥爲憤怒。燥爲先煩而漸至燥也。傷寒煩燥。則有陰陽虛實之別。心熱則煩。陽實陰虛。腎熱則燥。陰實陽虛。煩則熱之輕。燥則熱之甚也。有邪在裏而煩燥者。有不煩便作燥悶者。此爲陽盛隔陰。欲於泥水中臥。飲水不得入口也。

其或結胃證共而煩燥吐利。四逆湯。煩燥下利。發熱厥逆。煩燥不得眠。惡寒燥攣。脈不出而燥者。皆爲不可治矣。

太陽中風。脈浮緊。熱而惡寒。身疼痛。不汗出而煩燥。大青龍湯。

得病二三日。脈弱。無太陽證。柴胡湯。

證煩燥。心下硬。能食。小承氣湯微和之。心中悸而煩燥者。小建中湯。

惡風自汗。脈濡弱而煩燥者。皆宜用此法。

但發熱六七日。渴欲飲水者。五苓散。無熱。但狂言煩燥者。五苓散。水調服。探吐之。

陽明病。不大便。繞臍痛。煩燥。承氣湯下之。

少陽吐利。厥逆。煩燥欲死。吳茱萸湯。

厥逆。脈沉。自利。煩燥。不得眠。黃連雞子湯、黃連阿膠湯。

下後復發汗。晝則煩燥不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱。乾姜附子湯。

發汗若下之。病仍在不去。煩燥者。茯苓四逆湯。

陰極發燥。或陰毒火邪。投熱藥反劇者。不可用涼藥。燥甚仍與熱劑。用四逆湯輩。

懊憹

懊憹者。心中懊憹憹濃。鬱悶不舒之貌。蓋由表證誤下。正氣內虛。陽邪內陷。結於心胸之間。甚則爲結胸也。邪在心胸則宜吐。熱結胃腑則宜下。不可拘也。發汗吐下之後。虛煩不得眠。甚則反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯。舌上白胎。肌不能食。虛煩不眠。頭汗懊憹。上同。

短氣煩燥。咽硬。胸中懊憹。大陷胸湯。

陽明病下之後。懊憹而煩。中有燥屎。宜承氣湯。

陽明無汗。小便不利。心中懊憹者。必發黃。宜茵陳蒿湯。

身痛

身痛。太陽表證也。雖曰表邪未解。而有發汗溫經先後之不同。自利脈沉爲陰病。身痛其身重者。屬乎陽明。爲有風也。又有陽邪內行。不榮於表。是又不可不知。

太陽身痛。脈浮緊。無汗。麻黃湯。或尺脈遲爲無血。先用小建中湯。候尺脈浮。却用麻黃湯。

下利。脈沉。身痛。宜四逆湯輩。

發汗後身痛脈沉遲桂枝芍藥人參湯

一身盡痛發熱面黃七八日後結熱在裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯

霍亂後身痛不休桂枝湯

濕家身疼痛不可發汗發汗則成痓葛根桂枝湯

凡中濕身痛有本條

四肢拘急

拘急者手足不能自如屈伸不便如踡臥惡風之貌四肢者諸陽之本蓋因發汗亡陽陽虛是有其證也

傷寒脈自汗出小便數心煩惡寒脚攣急芍藥甘草湯小便難者桂枝加附子

太陽病發汗遂不止惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯

咳嗽

咳者謦欬俗謂之嗽肺主氣肺爲邪所乘氣逆而不下也故令咳嗽有肺寒而咳者有停飲而咳者有邪在半表半裏而咳者治各不同其水咳二證不可不辯小青龍太陽之表水也十棗湯太陽之裏水也眞武湯水證之水氣也蓋水與表寒相合而咳則小青龍當汗之水與裏寒相合而咳則眞武湯溫之裏癖合水動肺而嗽十棗湯所以下之也

太陽病。身熱。咳嗽。乾嘔。喘而利。小青龍湯。有加減法。惡寒身痛。只依本方。身涼咳嗽。乾嘔爲利。心下痞滿。引脅下痛。十棗湯。

四肢痛重。腹痛下利。咳嗽或嘔。眞武湯。有加減之法。少陽病。寒熱往來。胸脅硬滿而痛。咳嗽。小柴胡湯。有加減之法。

少陽咳嗽。四逆湯。腹痛下利。咳嗽。中滿而嘔。大半夏湯。

喘

傷寒發喘。有邪在表者。有邪在裏者。有水氣者。在表者、心腹濡而不堅。外證無汗。法當汗之。在裏者、心腹脹滿。外證有汗。法當下之。其水氣者、心下怔忡。是以有青龍湯之證。或注喘　汗出而喘。宜發之。雖然喘特病之常也。其或直視譫語。汗出髮潤。身汗如油。皆不可治。

太陽病無汗而喘。麻黃湯

陽明病。汗出。不惡寒。短氣。腹滿。潮熱而喘。小承氣湯。

太陽、陽明合病。喘而胸滿。不可下。宜麻黃湯。

誤下太陽。利不止。脈促。有汗而喘。葛根麻黃黃芩湯。

無汗而喘。麻黃杏仁甘草石膏湯。

水氣喘咳。乃太陽汗後。飲水多而水停心下。小青龍湯去麻黃加杏仁。小腹痛者。去麻黃加茯苓。陰病喘

促者。反陰丹。

氣逆

氣逆者。氣自腹中時時上衝也。蓋因太陽病下之。表邪乘虛傳裏。裏不受邪。則氣逆上行。仍在表也。當復汗之。厥陰客熱。氣上衝心。此熱在裏而氣上也。若病如虛羸少氣。氣逆欲吐者。又動氣發汗而氣上衝者。此正氣虛而氣逆也。當依法調治之。脈沉緊者。不可汗。

太陽病下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯。不上衝者。不可與之。病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈浮微。胸中痞硬。氣上衝咽喉。不得息。此爲胸中寒。瓜蒂散吐之。脈微者。不可吐。吐則心口逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身爲振搖。茯苓白朮桂枝甘草湯。

動氣發汗。氣上衝者。李根湯。

病後虛羸少氣。氣逆吐者。竹葉石膏湯。

短氣

短氣者。呼吸短促而不能相續也。千金方云。少氣不足以息也。金匱要略曰。短氣不足以息者實。大抵心腹脹滿而短氣者。邪在裏而爲實。心腹濡滿而氣短者。邪在表而爲虛。又有停水心下。亦令短氣。隨證攻治。無不愈矣。

短氣潮熱。腹滿而喘。此爲外欲解而裏欲實。大柴胡湯。小承氣湯。

風濕相搏。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。其邪在表。甘草附子湯。

食少飲多。水停心下。短氣。小半夏湯。

身涼乾嘔短氣。汗出不惡寒。此表解裏有水。十棗湯。誤下太陽。短氣煩燥。心中懊憹。便爲結胸。大陷胸湯及丸。

乾

邪熱聚於胃腑。消耗津液。故口乾熱而渴也。經曰。少陰病故口燥咽乾者。急下之。若不口燥咽乾而渴。脈沉者。急溫之。又有漱水不下咽者。若見表證必衄。爲邪熱在經也。以血氣俱多。經中熱甚。迫血妄行而作衄者。無表證加之。胸腹滿而如狂者。又爲畜血在內者。

陽明口燥咽乾。無大熱。背微惡寒。煩渴。白虎加人參湯。

少陽口燥咽乾。小柴胡湯。

少陰口燥咽乾而渴。急下之。用承氣湯。

陽明病。口燥欲漱水不嚥者。必衄。黃芩、芍藥湯。漱水不咽。發狂。輕者犀角地黃湯。甚者抵當湯。

渴

渴者、裏有熱也。津液爲熱所耗。故令渴也。傷寒六七日。傳至厥陰爲消渴者。渴飲水多而小便少。乃熱能消水也。朱氏曰。脈浮而渴屬太陽。有汗而渴屬陽明。自利而渴屬少陰。至於厥陰。則又熱之極矣。太陽無

汗若渴。忌白虎。宜柴胡湯。陽明多汗而渴。戒五苓。宜竹葉石膏湯。若先嘔後渴。則爲欲解。當與之水。先渴後嘔。則爲水停。屬赤茯苓湯。當從此議。勿令誤也。

太陽病發渴脈浮。表不解。心下有水氣。小青龍湯去半夏加瓜蔞。服桂枝湯。

汗出後煩渴甚者。白虎加人參湯。

小便不利而渴。五苓散。

身熱惡風。手足濈然而渴。小柴胡去半夏加瓜蔞。陽明發渴。則有汗。脅下硬。不大便而嘔。舌上白胎。小柴胡湯加減同用。

若汗少。小便不利。脈浮而渴。五苓散。渴而飲水嘔者同。

發黃頭汗出。小便不利。渴飲水漿。茵陳蒿湯、茵陳五苓散。

少陽發汗則自利。咳而嘔。引水飲。猪苓湯。

下利。渴欲飲水。白頭翁湯。

下利。脈數而渴者。自愈。不愈必下清血。宜黃芩散。

病人脈微細。欲吐不吐。心煩但寐。小便白。下利而渴。四逆湯。

陽毒

大熱大渴。黑奴丸。中暑發渴。白虎加人參湯。

胸脅滿痛

胸滿者、胸膈間氣塞閉也。非心下滿者。脅肋下氣塡脹滿也。非腹中滿。蓋邪自表傳裏。必先自胸脅以至心腹而入胃。是以胸滿多帶表證。宜發汗。脅滿者。多在半表半裏之間。宜和解。至於邪結胸中而爲實者。又須湧吐之也。

太陽病。下後脈促胸滿。桂枝去芍藥湯。病在於胃氣。芍藥入榮。故去之。

陽明病。喘而胸滿。猶帶表證。不可下。與麻黃湯、麻黃杏仁甘草石膏湯。

胸脅俱滿。或脅下硬痛。或嘔吐。舌上白胎。或不大便。並屬小柴胡湯。

傷寒五七日。往來寒熱。胸脅若滿。默默不飮食。心煩喜嘔。或脅下痞硬。柴胡加牡礪湯。

傷寒七八日。下之。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡痛。不可轉側。柴胡加龍骨牡礪湯。胸中痰實。瓜蒂散吐之。胸膈不快。塡滿閉塞。唇青手冷。脈細沉。少情緒。或腹痛。此名太陰。

結胸

經曰。病發於陽而反下之。熱入。因作結胸。註曰。發熱惡寒者。發於陽也。外證項強。心下滿硬而痛是也。此爲實邪在裏。法當下之。若脈浮大。若表證。若水氣塡。不可下。亦有不因下而心下硬滿者。經曰。病人手足厥。脈乍緊。邪結胸中。心滿而煩。飢不欲食。當吐之。是則病在胸中也。經曰。陽明病。心下硬滿。不可下。下之利不止而死。是則邪氣自表傳裏。留於心下。未全爲實。法當吐之。故有此戒。其或結胸證具而煩燥者。不

治。

結胸寸脈浮。關尺皆沉緊。宜下。若脈浮大。或有表證。先用小柴胡湯。表已解。下之。大結胸。不按而痛連臍。腹痛硬。不可大陷胸湯。或太峻。用丸。

小結胸。按之而痛。心下硬。小陷胸湯。

熱實結胸。懊憹煩渴。心下痛。少與大陷胸湯。

寒實結胸。無熱證。三物白散、枳實理中丸。

痞

經曰。病發於陰而反下之。因作痞。註云。無熱惡寒者。發於陰也。輕於結胸者。心下滿而不痛。按之則濡。是其虛邪留滯。故但滿而不痛也。惟枳桔最良。欲攻之。只從表證解而後可。

痞者。關脈多沉。枳實理中丸、半夏瀉心湯。關脈沉者。三黃湯瀉其肝。若惡寒者。附于瀉心湯。服此湯。痞不去。煩渴。小便不利。五苓散。

下後復汗。心下痞而惡寒。表不解。不可攻痞。先與桂枝湯。表解乃攻痞。三黃湯。

表未解而心下妨悶。曰支結。柴胡桂枝湯。胸脅滿而微結。小柴胡湯加乾姜、牡礪。表證未罷。因攻之。脅熱而利。心下硬。爲表裏俱病。桂枝人參湯。

下利。心下痞硬。乾噎食臭。腹鳴。甘草瀉心湯、生姜瀉心湯。治法通用桂枝人參湯。若下利不止。則治下焦。

赤石脂禹餘糧湯又不止只利小便五苓散
發熱不解嘔吐不利心下痞硬大柴胡湯吐汗下後噎氣痞硬旋覆代赭湯
若咳逆氣虛用四逆湯
胃寒先宜理中丸後用旋覆代赭湯

腹滿

脾爲中央之土所以腹滿多屬太陰也常病者爲表實從下之時減者爲裏虛當溫之若解表內不消非大滿尤生寒熱未可下是邪全未入腑若大滿大實兼有燥屎雖得之四五日亦爲可下謂邪已入腑也大抵陽熱爲邪則腹滿而咽乾陰邪爲寒則腹滿而吐利食不下若雖經吐下後而腹滿者治法又各不同是又不可不知也
太陽誤下因時腹滿而痛桂枝加附子湯痛甚桂枝加大黃湯
陽明發熱腹滿微喘口苦咽乾或不大便譫語者並小柴胡湯噦而小便難加茯苓
三陽合病腹滿身重難以轉側譫語口中不仁小柴胡湯有汗白虎湯
太陰腹滿吐食不下枳桔理中丸
少陰病六七日腹脹滿不大便急下之大承氣湯
腹滿痛者脾不勝水水與氣搏皮肉之間腸中漉漉有聲小半夏茯苓湯加桂枝下利腹滿身疼痛先溫

其裏四逆湯後攻其表桂枝湯
發汗後腹滿當溫厚朴半夏生姜人參湯吐後腹滿當下少與調胃承氣湯下後腹滿宜梔子厚朴湯腹脹滿者陰陽不和桔梗半夏湯

腹痛

邪氣入裏與正氣相搏則爲腹痛蓋陽邪傳裏而痛者其痛不常當以辛溫之劑和之陰寒在內而痛者則痛無休時欲作利也當以熱劑溫之有燥屎宿食爲痛者則煩而不大便腹滿而痛也則後用下經曰諸痛爲實痛隨利減此皆爲裏證而所治各不同矣又當隨證施治

傷寒四五日腹中痛若轉氣不趣小腹者此欲自利也四逆湯
少陰腹痛四逆或咳或悸或小便不利或瀉利下重幷四逆散
下利青穀脈微欲絕通脈四逆湯腹痛小便不利眞武湯
胸中熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者黃連湯
大便實痛者關脈實腹滿不大便桂枝加大黃湯大小承氣湯選用之

小腹滿

小腹滿者臍下滿是也若胸滿心下滿腹滿皆爲邪氣而非物今小腹滿皆爲有物而非氣小便利者則爲畜血之形小便不利者乃是溺澁之證滲利之劑宜分兩途經曰病人素有痞氣連在臍傍痛引小腹

入陰筋者名臟結也死

太陽病不解熱結膀胱其人如狂小腹急結桃仁承氣湯

太陽病六七日表證在脈微沉不結胸發狂小腹硬滿小便自利抵當湯

太陽病目黃脈沉結小腹硬小便不利者五苓散陰陽易小腹痛燒裩散

病者手足厥冷眞武湯不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元宜灸關元穴

嘔吐

嘔者聲物俱出者也吐者無聲而但出物者也故仲景復重言乾以別之則嘔爲有物明矣乾猶空也但空嘔而無所出耳然嘔吐俱有物出較之輕重則嘔甚於吐蓋表邪搏裏裏氣上逆故嘔吐而水穀不下也有胃熱脈弦數口舌煩渴有胃寒脈弦遲逆冷不食小便利有水氣先渴後嘔膈間怔忡有膿血喉中腥奔逆上衝不須治之嘔膿盡自愈是四者不可不辨大抵邪半在表半在裏則多嘔吐及其裏熱而嘔吐者亦有之故經曰嘔多雖有陽明證不可攻之爲其氣逆未收斂爲實也設或嘔而脈弱小便復利身惟熱而見厥者難治以其虛寒甚也

太陽少陽合病自利而嘔黃芩加半夏生姜湯

太陽陽明合病當自利若不利但嘔葛根加半夏湯

傷寒胸中熱胃中有邪氣腹痛氣逆欲嘔吐者黃連湯

太陽病。發熱汗出。心下煩欝。痞硬不利。嘔吐。大柴胡湯。

三陽發熱而嘔逆。小柴胡湯。嘔而渴者。猪苓湯、五苓散。

先嘔後渴。此爲欲解。宜與水解。先渴後嘔而水停心下。赤茯苓湯。

少陰病。又吐。但欲寐。五六日自利而渴。小便色白。四逆湯加生姜。

少陰病。又吐。但欲寐。五六日自利而渴。小便色白。四逆湯加生姜。

少氣或咳或悸。身痛自利。眞武湯去附子加生姜。膈上寒飲。乾嘔。吐涎沫。四逆湯。

若吐利。手足厥冷。煩燥甚者。吳茱萸湯。

食穀欲嘔者。屬陽明也。上同。得湯反劇者。屬上焦。橘皮湯、小柴胡湯。似嘔似噦似喘。心下憒憒。大橘皮湯。

汗下後關脈遲緩而吐。爲胃寒。理中丸。

瘥後虛煩嘔吐。竹葉石膏湯。加生姜汁。屢經汗下。食氣膈塞。食入卽吐。乾姜黃芩黃連人參湯。

汗後水藥不入口者。四逆半夏茯苓湯。金匱要略曰。諸嘔吐。穀不下。半夏湯。嘔吐脈滑數或洪。發熱。茅根湯。

乾嘔

乾嘔者、嘔而無物出也。大抵熱在胃脘。與穀氣幷。熱氣上薰。心下痞結。則有此證。太陽汗出乾嘔。桂枝湯。

主自汗也。少陰下利乾嘔。姜附湯。主下利也。厥陰吐沫乾嘔。吳茱萸湯。主涎沫也。邪去則吐自止矣。若有水氣二證。又當以表裏別之。

傷寒表不解而心下有水氣乾嘔身熱微喘或自利小青龍湯主之
不發熱不惡寒肋痛欬而利乾嘔者十棗湯下之
自汗頭痛乾嘔桂枝湯
少陰下利乾嘔脈微白通湯下利不止乾嘔而煩厥逆無脈白通加猪膽汁湯
惡寒外熱脈微欲絕乾嘔通脈四逆湯
膈上有寒飲乾嘔亦屬少陰四逆湯
乾嘔吐痰沫頭痛吳茱萸湯得此湯反劇者與小柴胡湯
乾嘔自利黃芩湯半夏生姜湯太陽中風陽浮陰弱自汗惡風寒發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯乾嘔噦若手足厥者橘皮湯

欬逆噦

夫咳逆者俗謂之吃忒是也穢發聲於喉間則遽止吼吼然連續數聲然而短促不長古人謂之噦者非也噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長然皆有聲而無物病至於噦則危難治矣大抵鬲近於噦鬲者但胸間氣塞不得下通噦則惡濁之聲達於外矣蓋因胃氣本虛汗下太過或腹飲水水寒相搏虛逆而成經曰陽脈浮則爲氣鬲又曰脈滑則爲噦此爲醫咎責虛取實之過也又有熱氣擁鬱上下氣不得通而噦者輕則和解之通利之甚則溫散之設若不尿腹滿而噦者咳逆脈散而無倫者雖神醫不能措手與傷

寒咳而氣逆者。又不同也。若將喫忒紮於噦與咳而氣逆。則誤人多矣。臨病之際。宜明辨之。欬嗽大便少。與大承氣湯下之。蓋由熱氣衝膈肝肺故耳。若便軟瀉心湯。胃氣虛而衝脈逆也。若脈散者。不治。咳逆潮熱。小柴胡加橘皮生姜湯。

厥逆不止。烏苓湯。有寒者。羌活附子散。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或餚。小青龍湯。去麻黃。加附子。

寸口脈浮大。醫反下之。爲逆。又飲冷水。令汗大出。水得寒氣。冷必相搏。其人卽餚。荳蔻湯。

噦而腹滿。大便不利。先宜半夏生姜湯。次用承氣湯。小便不利。猪苓湯。

陽明中風。脈浮弦。小便難。潮熱而噦。小柴胡湯。加茯苓。

嘔噦。手足冷。逆。小橘皮湯。

若胸滿虛煩。大橘皮湯。

胃氣寒者。吳茱萸埋中湯。溫中湯。

金匱要略曰。噦逆者。橘皮竹茹湯主之。

噦不止者。橘皮乾姜湯。半夏生姜湯。退陰散子。宜消息用之。

溫病熱未除。重被暴寒入胃。蘊結不散。變噦。梓皮飲子。

溫病有熱飲水。暴冷作噦。茅根葛根湯。

溫病。胃冷變噦。茅根橘皮湯。

溫病。有熱。飲水暴冷。枇杷茅根湯。

下利

傷寒。表邪傳裏。裏虛助熱。則自下利。又有不應下而便攻之。內虛協熱。亦爲下利。要當別其陰陽。三陽下利。自太陽下利。手足溫。少陰厥陰下利。身涼無熱。此大概也。自利清穀不渴。小便色白。微寒厥冷惡寒。凡此皆寒。渴欲飲水。溺色如常。泄下赤黃。發熱後重。凡此皆熱。蓋因風邪入胃。水來侮土。故令暴下。或溫或攻。或清下焦。或利小便。隨證施治。但不宜發汗耳。邪氣內攻。復泄其津液。胃氣轉虛。必成脹滿。若夫下利譫語而目直視。下利厥噪不得眠。下利發熱厥而自汗。下利厥冷無脈。灸之不溫而脈不出。下利日數十行。其脈反實。皆爲不治之證。五者最忌者也。

太陽陽明合病。下利。頭目痛。鼻乾。脈浮。葛根湯。

太陽少陽合病。下利。頭痛。胸滿。乾嘔。脈浮弦。黃芩湯。嘔甚。加半夏、生姜。

少陽陽明合病。下利。身熱。胸脅滿。乾嘔。往來寒熱。脈長大而弦。弦而爲負。負者死。長大不弦爲順。大承氣湯下之。

滑而數。爲有宿食。亦從下之。太陽病未解。而欲下之。遂熱而利。心下痞硬。表裏不解者。桂枝人參湯。

太陰自利不渴。四逆湯理中湯。朮附湯。

少陰下利不渴。腎虛飲水自救。脈微者。白通湯。

厥逆無脈者。白通加豬膽汁湯、四逆湯。

少陰下利。渴而嘔止。煩不得眠者。豬苓湯。

少陰下利。咽痛胸滿心煩者。猪膚湯。

自利清水。心下必痛。口中乾燥。此不可溫。宜用下。大承氣湯。

傷寒。醫下之。續得下利清穀。身痛者。急當救裏。宜四逆湯。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。

胃熱利白。腹垢。臍下必熱。便下垢膩赤黃。或渴。黃芩湯、白頭翁柏皮湯。通用之白虎湯。

胃寒利白。鴨溏。臍下必冷。腹脹滿。便中清白。或清穀。四逆湯。理中湯。寒毒下利。面帶陽者。下虛也。下利讝語。有燥屎也。脈不微細。小承氣湯。

尺脈弦。腸鳴泄利腹痛者。冷痛也。小建中湯。三部平。心硬而下利者。腸胃積結也。宜下之。大承氣湯。

下利脈滑。當有所去。下之乃愈。大承氣湯。下利脈大者。虛也。以其強下之故也。設脈浮革。因爾腸鳴者。當歸四逆湯。

下利瘥後至其年月復發者。以痛不盡故也。宜下之。大承氣湯。

便膿血

衝脈爲血之海。卽血室也。男女均有此血氣。均有此衝脈。衝之得熱。血必妄行。在男子則爲下血讝語。在

婦人則爲寒熱似瘧。皆爲熱入血室。逼血下行。則血熱而利也。挾血之脈。乍澁乍數。或伏或沉。血熱交併。則脈洪盛。大抵男多於左手。女多於右手見之。又有陰寒爲病。下利便膿血者。乃下焦虛寒。腸胃堅固。清濁不分。而利下膿血也。二者、一爲挾血。一爲陰寒。臨病宜精別焉。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。而血自下者。愈不愈。用桂枝湯。明理論。抵當湯。

陽明病。下血譫語。胸脅滿如結。胸夜則見鬼。此爲熱入血室。小柴胡湯。

少陰病。下利便膿血者。桃花湯。

腹滿身熱。下如魚腦。曰濕毒。桃花湯、地楡散、黃連阿膠湯。

下後無表裏證。脈數不解。散消穀易飢。多日不大便。此爲瘀血。桃仁承氣湯、抵當湯。或小柴胡湯加桃仁、大黃。

下焦畜火。其人如狂。小腹急結。小便必利。抵當丸。

四逆

手足不溫。謂之四逆。邪在表則手足熱。邪在表裏之間則手足溫。至於邪傳少陰。則手足有逆冷之證。與厥陰又相遠也。然自熱而至溫。自溫而至厥。乃傳經之邪。輕則四逆散。重則承氣湯下之。非若得病手足便逆而不溫者。四逆湯溫之。則爲陰經受邪而陽氣不足也。其或吐利煩燥。厥逆蹉臥。皆屬少陰。又爲不治之證。

少陰病。四逆。其人或咳或悸。或小便不利。或腹中痛滿。或利下重。並四逆散。

初病以來。厥冷四逆。卽四逆湯。

手足逆冷。大便閉。小便赤。或大便黑色。脈沉而滑。此爲陽證。以白虎湯甚者、大承氣湯。

厥逆

陽氣伏藏。陰氣越出。陰陽不相順接。所以厥也。若先熱而後厥者。乃熱邪伏於內也。先厥而後熱者。乃陰退而陽得復也。

若始得病便厥者。是陽不足而陰勝也。熱浮於內者。其脈沉而數。狂言發渴。露手揚衣。燥不得眠。或大便閉。初便厥者。其脈沉遲而弱。醒醒而靜。惡寒引衣。或下利清穀也。其或惡寒蹉臥。煩燥下利。不知人。皆爲惡候。故曰逆也。

先發熱而後厥者。揚手擲足。煩燥飲水。畏熱。頭汗。大便閉。小便赤。怫鬱昏悸。當下。失下血氣不通。所以謂熱深則厥者、此也。大柴胡湯、小承氣選而用之。

初病便厥。足攣惡寒。引衣自蓋。不渴。大小便自利。默默而惶惶。諸四逆選用之。

傷寒厥而心下悸者。宜先治悸。茯苓桂甘湯。後治厥。四逆湯。吐利厥逆。煩燥欲死者。吳茱萸湯、當歸四逆湯。仍灸大谿。

不大便

不大便。謂大便難也。皆因發汗、利小便、耗其津液。以致腸胃乾燥。而轉屬陽明裏者、多矣。其小便自數者。則爲津液偏勝。故使大腸亦難也。若下若發汗。小便數。大便硬者。與承氣湯和之。謂津液內竭也。又有不宜便下者。至於脈浮脈虛惡寒。此尤帶表邪。乃不可下。其嘔吐。爲邪未入腑。雖有陽明證。不可攻之。小便清者。知邪不在裏。仍在表也。大便難。小便少。不轉失氣。此內無燥屎也。但初硬後溏。爾陽明脈浮。或經發汗。小便自利。不大便者。亦津液內竭。宜蜜導煎通之。經曰。其脈浮而數。能食。不大便。此爲實。名曰陽結也。宜大柴胡湯。若不了了。得屎而解。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便反難。名曰陰結也。宜金液丹。

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。小承氣湯。

病人不大便六七日。繞臍煩燥。發作有時者。此爲屎硬。不得大便。小承氣湯。

夫病陽明者。下之則硬。汗多。極發其汗。則亦硬。並小柴胡湯。

陽明病。脅下硬滿。不大便而嘔。舌上白胎。小柴胡湯。

少陰病。六七日。腹脹。不大便。急下之。大承氣湯。

若發汗。若利小便。津液內竭。大便自難者。不可攻之。無陰陽強。大便者。下之。必清穀脹滿。並用蜜導煎。

譫語鄭聲附

經曰。邪氣盛則實。精氣奪則虛。故實則譫語。虛則鄭聲。傷寒胃中熱盛。上乘於心。爲熱冒。則神識昏迷。妄有所見而言也。輕者、睡中呢喃。重者、不睡亦語。亦有譫語者。有獨語者。有語言不休者。有言亂者。凡此見

其熱之輕重也。大抵熱入于胃。水涸屎燥。必發譫語。又有被火劫者。有亡陽者。名各不同。但氣短者死。脈自和則愈。或喘滿氣逆而上奔。自利柔脫而奪下。皆爲逆也。譫語者、脈洪數。大便閉。小便赤。手足溫。與調胃承氣湯。

胃實譫語。身熱汗多。便難。或潮熱。諸承氣湯選用之。發汗多。亡陽譫語。身自和。不可下。柴胡桂枝湯。

下利譫語。爲有燥屎。脈不微細。小承氣湯。

利不止者、不治。

三陽合病譫語者、脈滑石。身重難以轉側。口中不仁。面垢。遺尿。不可汗下。與白虎湯。

傷寒大熱。乾嘔。呻吟錯語。不得眠。犀角解毒湯。

得病無熱。但狂言煩燥不安。精采不與人相當。與五苓散二錢。以新汲水吐之。則愈。一法用猪苓湯。

瘀血。狂言譫語。溲水大便黑色。小便多。身黃腹滿。此爲當汗不汗。皆熱在裏。輕者、犀角地黃湯。甚者、桃仁承氣湯、抵當丸。

婦人熱入血室。晝靜。夜譫如見鬼狀。小柴胡湯。

陽明病。其人喜忘。必有瘀血。抵當丸。

鄭聲者、重語也。又爲不正之音也。傷寒鄭聲。如鄭衛之音不正也。蓋因後汗。若病人本音失而正氣虛。則鄭重語。不知高下。乃精氣奪之候也。其脈微細。二便利。用白虎湯。

小便不利小便難附

邪氣聚於下焦結而不散甚則小腹硬滿而不痛此小便所以不通大抵有所不利者行之所以滲泄也若飲水過多下焦畜熱或中濕發黃水飲停留皆以利小便爲先惟汗後亡津液胃汁乾與陽明汗多者則以利小便爲戒設或小便不利而見其汗者乃爲陽脫關格之疾矣飲水過多下焦畜血熱小便不利脈浮者用五苓散脈沉者猪苓湯

太陽病身黃脈沉者猪苓湯

太陽病身黃脈沉結小腹硬小便不利者爲亡血也五苓加茵陳嘔而發熱胸滿心下怔忡小便不利者爲亡血也五苓加茵陳、茯苓

少陰病四逆或小便不利四逆散加茯苓

陽明病無汗小便不利心下懊憹者身必發黃五苓散加茵陳經曰虛則小便難陰虛者陽必湊之由膀胱受熱致小便赤澁而不流利也又曰雖不大便也六七日而小便少者但初硬後溏未定或硬攻之必溏縱小便多屎定硬方可攻之乃胃中有穀不別雖通而不能也

陽明中風脈浮弦大身黃鼻乾氣短腹滿潮熱時噦心脅痛小便難小柴胡茯苓

太陽病小便利者以飲水多必有心下悸茯苓白朮甘草湯小便少者必裏急猪苓湯

小便自利小便數遺溺附

小便自利者。爲津液漏滲。大便必硬。宜以藥微下之。其陽明自汗者。復發其汗。使津液內竭。屎雖硬。尤不可攻。縱使大便難。蜜導煎導之。太陰當發身黃。其小便自利者。則濕熱內泄。不能發黃。惟血證則腹急而如狂。腎與膀胱虛。則不能約制水液。二者皆小便自利。若腎與膀胱虛而挾熱。熱則水道澁。則小便不快。故澁淋而數起也。若自汗而小便數者。雖有表證。又不可用桂枝。謂亡走津液也。

太陽病。小便自利。以飲水多。心下悸。茯苓桂枝、茯苓甘草湯。

太陽自汗。四肢拘急。心煩。微惡寒。脚攣急。小便數。誤服桂枝湯。得之便厥。與甘草乾姜湯、甘草芍藥湯。

脈浮自汗。小便數。胃不和。譫語者。少與調胃承氣湯。陽明脈浮而澁。浮則胃氣強。澁則小便數。浮澁相搏。大便則難。其脾爲約。宜麻仁湯。

少陰四逆。小便自利。或色白。爲虛寒。四逆湯。或眞武湯去茯苓。既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈浮欲絕者。四逆湯。

舌上白胎臟結附

經曰。舌上如胎者。以丹田有熱。胃中有寒。謂寒氣初傳入裏也。舌乃心之官。法應南方火色本紅。乃邪氣在表。舌則無胎。又邪氣在裏。津液結搏。則舌上生胎而滑。熱氣漸深。其舌胎燥而澁。熱聚於胃。其舌胎爲之黃矣。若間黑色。則熱已深。病已極篤。經曰。舌熱病。口乾舌黑者死。乃腎水刑於心火也。

脈陰陽俱緊。曰中氣出。唇口乾燥。踡臥足冷。鼻中涕出。舌上滑胎者。勿妄治也。到七八日以來。其人微發

熱手足溫者此爲欲解或八日已上反大發熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也小柴胡湯加生姜腹內痛者必欲利也理中湯

太陽誤下胃中空虛客熱動膈懊憹舌胎梔子豉湯少陽病脅下硬滿不大便而嘔舌上白胎小柴胡湯

陽明病舌上生胎五苓散舌黃者當下之金匱要略曰舌黃者未可下黃自去也

臟結者臟氣祕結而不流布也一息不運機緘窮一毫不續窮壤判臟其可結乎外證如結胸狀但欲食如故時時下利爲異耳其脈寸浮關沉而緊陰筋引臍腹俱痛是也病人脅下素有痞連臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也刺開元灸之亦可仍與小柴胡湯加生姜

咽痛

咽喉不利或痛或癢不可納食皆毒氣上衝所致經曰太陽病下之脈緊者必咽痛以太陽之邪搏於少陰也少陰之脈循喉嚨挾舌本少陰咽痛脈浮遲厥冷或吐利亦屬少陰並不可汗下用桔梗湯猪膚湯甚者半夏散通脈四逆湯去芍藥加桔梗汗不止蠶本溫粉撲之咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯若傷寒六七日大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不利唾血膿手足厥利不止者難治宜麻黃升麻湯

腎傷寒一證乃非時暴寒伏於少陽之經頭痛腰痛脈微弱初咽痛以傷寒後必下利咽痛半夏桂枝湯卽半夏散利四逆湯

陽毒咽痛見發斑條咽中閉塞烏扇湯口瘡赤爛蜜浸黃柏噙咽痛甚者升麻六物湯

頭眩

少陽居表裏之間。表邪傳裏。表中陽虛。故頭眩也。又有發汗吐下後而眩者。亦陽虛所致也。若少陰病下利止而頭眩。時自冒者。此虛極而脫。而風家亦有眩者。風主運動故也。其或諸逆發汗劇者。言亂目眩而死也。

太陽病。若下之。因復發汗。以此表裏俱虛。其人必眩冒。胃家汗自出而愈。

陽明病。但頭眩不惡寒。故能食瞤咳。茯苓白朮甘草桂枝湯。

少陽之爲病。口苦、咽乾、目眩。小柴胡湯。

太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地。眞武湯。

吐汗下後。虛煩。脈微沉緊。心下痞。脅下動氣。咽喉眩冒。身搖。筋脈動惕。久而成痿。茯苓桂枝白朮甘草湯。

痿用括蔞湯。

鼻衄

經絡熱盛。迫血妄行。出於鼻者。爲衄血也。是雖熱。其邪尤在經。然亦不可發汗。經曰。以桂枝、麻黃治衄。非治衄也。乃欲散其經中邪氣耳。衄血故爲欲解。若衄不止而頭汗出。其身無汗。及發熱汗不至足者。又爲惡證。當明辨之。

太陽證衄血。及服桂枝湯後致衄者。爲欲解也。屬犀角地黃湯。衄不止。茅花湯。無汗能食者。卽欲衄。黃芩

湯。

衄家不可發汗。汗出必額上陷。脈緊急。直視不能眴。不得眠。芍藥地黃湯。

陽明病。渴欲漱水不嚥者。必衄。黃芩芍藥湯。

不因下而自利加衄者。麻黃升麻湯。脈浮大。欲發熱。下利。鼻衄。乾嘔者。黃芩芍藥。衄煩而復渴欲飲水。水入卽吐。先服五苓散。次服竹葉石膏湯。

少陰病。但厥無汗。強發之。必動其血。或從口鼻。或自目出。名下厥上竭。爲難治。當歸四逆湯。仍灸太谿、三陰交、湧泉一法用黑錫丹。

吐血

諸陽受熱。其邪在表。當汗不汗。致使血毒入臟。積瘀於內。遂成吐血。凡見眼閉目紅。神昏語短。眩冒迷妄。煩燥漱水。狂驚譫語。鼻衄唾紅。背冷足寒。四肢厥逆。胸腹急滿。大便黑利。小便頻數。皆瘀血證也。不必悉具。但見一二。便作血證主張。初得此病。急宜用藥。至於陸續不已。經數時而腹痛者。此又難於料理也。經曰。服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。犀角地黃湯。大下後。寸脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。唾膿血者。麻黃升麻湯。此有兩證。一陽毒。一陰毒。陽毒用升麻湯。陰毒用甘桔湯。加半夏、生姜。

血熱者。黃連阿膠湯。地榆柏皮湯。三黃瀉心湯。

脈浮發熱。反灸之。必咽噪吐血。救逆湯。

咽喉閉塞。不可發汗。發熱則吐。血氣欲絕。手足厥冷。蹉臥不能自溫。當歸四逆湯。

心悸

心悸者。築築然動。怔忡不能自安者。是也。其證有二。一者氣虛。一者停飲。其氣虛者。陽氣內弱。心中空虛而爲悸。又有汗下之後。正氣內虛。亦令人悸。與氣虛而悸者。則又甚也。法當定其氣悸也。其停飲者。由飲水過多。停留心下。心火畏水。不能自安而爲悸也。治法。必先分水氣。雖有餘邪。亦先治悸。免使水氣散走。而成他證也。

傷寒二三日。心中悸而煩。小建中湯。經云。先煩而悸者。此爲熱。先悸而煩者。此爲虛。故宜建中湯。

太陽病。小便利者。以飲水多。故心下悸。茯苓桂枝白朮甘草湯。小便少者。必裏急。猪苓湯。

陽明病。壯熱來往。心下悸。小便不利。心煩喜嘔。小柴胡湯。

太陽病。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯。

發汗後。其人臍下悸。欲作奔豚。茯苓桂枝白朮甘草湯。

太陽病。發汗不解。仍發熱。心下悸。頭眩。肌體瞤動。振振欲擗地。眞武湯。

少陽病。耳聾目赤。胸滿而煩。妄加吐下。則悸而驚。與小建中湯。有熱者。小柴胡湯。

少陰病四逆。其人或悸。四逆散加桂枝。心下有水氣。厥而悸。當先治水。茯苓甘草湯。不然。水入胃中。必不利也。

傷寒脈結代。心動悸。炙甘草湯。

發黃

內經曰。濕熱相交。民多病癉。癉者、單陽而無陰也。太陰脾土。爲濕熱所蒸。則雖見於外。必發身黃。濕氣勝、則如薰黃而晦。熱氣勝、則如橘黃而明。傷寒至於發黃。熱勢已極。且與畜血大抵相類。小便不利爲發黃。小便自利爲畜血也。設或寸口無脈。鼻出冷氣。與夫形如烟薰。搖頭直視。環口黧黑。舉體發黃。是皆眞臟氣絕也。

傷寒。瘀血在裏。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯。

太陽中濕發黃。身熱頭痛。目黃汗出。濕在裏。五苓散、梔子蘗皮湯。

濕家之爲病。一身盡痛。發熱。身雖如似熏黃。小便不利。五苓散。小便自利。朮附湯。身煩痛。麻黃湯加蒼朮。

脈浮身重。汗出惡風。防己黃耆湯。

陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如鼓。穀疸湯、五苓散加茵陳。

陽明傷寒發黃。易飢。短氣腹滿。鼻乾咽燥。心脅痛。小便難。潮熱咳嗽。頭眩嗜臥。脈絃浮大。小柴胡湯加茯苓。

血證發黃如狂。小便多。大便黑。犀角地黃湯、桃仁承氣湯、抵當湯。選用之。

黃疸。脈浮滑緊數。頭面汗出。渴飲水漿。小便不利。茵陳蒿湯調五苓散。

初發黃。以瓜蒂末口噙水搐鼻中。黃水出。愈。

發狂

難經曰。重陰者顛。重陽者狂。傷寒熱毒在胃。併入于心。遂使神不寧而志不定也。故發狂。始則少臥不飢。妄語妄笑。甚則登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。皆獨陽亢極。熱之所致。非大下之。不能止也。亦有當汗不汗。瘀熱在裏。下焦畜血如狂者。小便不利。時如狂。未至于狂耳。若夫狂言直視。便溺自遺。其與汗後大熱。脈燥。狂言。不食。又爲可慮也。

重陽卽陽毒。脈數實。狂走錯語。煩燥乾嘔。而赤咽痛。潮熱發狂。或下利黃赤。陽毒升麻黃芩湯。

時行熱病發狂。黑奴丸。經曰。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂而血自下者。愈。若外不解。與桂枝湯。外已解。但小腹急結。桃仁承氣湯。

血證如狂。脈微。身黃。唇燥嗽水。無寒熱。小腹滿。小便不利。大便黑。犀角地黃湯。甚者、桃仁承氣湯、抵當丸、取下黑物爲效。

筋惕肉瞤

內經曰。陽氣者、精則養神。柔則養筋。發汗過多。津液枯少。陽氣偏虛。筋肉失所養。故惕然而跳。瞤然而動。非溫經助陽不可也。張氏故特設眞武湯以救之。或因發汗吐下後。表裏俱虛而有此狀者。此又逆之甚矣。

太陽病。發汗不解。發熱。心悸。瞤眩。身瞤欲擗地。眞武湯。

發汗過多。或虛弱人微發汗。或傷風自汗。妄用大青龍湯。便有厥逆筋惕肉瞤之證。並屬眞武湯。羸者去芍藥。有熱者去附子。應發而腹中左右有動氣者。並不可汗。汗之則筋惕肉瞤。或頭眩汗出不止。其後最逆。先宜防風白朮牡礪湯。次服小建中湯。十救一二。吐下之後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。身振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯。久而成痿者。通用。心下痞滿者。枳桔湯。加茯苓甘草。

多眠汗下附霍亂

夫衞氣者。晝行於陽。夜行於陰。行陽於寤。行陰於寐。陽氣虛。陰氣盛。則目瞑。故多眠。乃邪氣傳於陰而不在陽也。皆昏閉目。陰自閻也。默默不言者。陰主靜也。經曰。太陽病十日已去。脈浮細嗜臥者。外已解也。鼻乾不得汗嗜臥者。風熱內攻。不干乎表。故熱氣伏於裏。則喜睡也。三陽合病。但欲眠睡。目合則汗。譫則有熱也。見盜汗。其胃熱。亦嗜臥也。風溫狐惑。亦有是證。又當辨之。

太陽病十日。脈浮細嗜臥者。外雖已解。設胸滿。脅痛。鼻乾。不得汗者。小柴胡湯。脈但浮者。麻黃湯。

少陰病。但欲寐。尺寸俱沉細者。四逆湯。

少陰病。欲吐不吐。心煩多寐。尺寸俱沉細者。四逆湯。

少陰病。欲吐不吐。心煩多寐。五六日自利而渴。小便白者。則止矣。

其濕霍亂死者少。乾霍亂死者多。若上不得吐。下不得利。所傷之物不得出泄。壅閉正氣。陰陽懸隔。喘脹

而死。素問。食飲有節。起居有常。安得有霍亂也。霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多。欲飲水。五苓散。寒多不飲水者。理中湯。吐利汗出。脈微。惡寒。手足厥冷。拘急。四逆湯。腹滿而痛。四肢拘急。轉筋。下利。理中湯。加附子、官桂。加減詳見本方。

吐利止。身痛不休。桂枝湯。既吐且利。小便復利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。四逆湯。

吐利止。但汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絕者。通脈四逆。加猪膽汁。

陰陽易陰陽交

凡男子陽易、婦人陰易者。病新瘥而動淫慾也。其候。身重氣乏。小腹絞痛。頭不能舉。足不能行。四肢拘急。百節解散。眼中生花。手足拳攣。其脈離經。皆不可治。或榮衛精髓竭。翕翕少氣。手足不能舉者而死。吁。外傷六氣。內傷七情。其爲害若是耶。

燒裩散、猳鼠屎湯、竹皮湯、乾姜湯、青竹茹湯、當歸白朮湯、宜選用之。

陰陽交者。溫病不得發汗。汗之復生大熱。狂言不食。其脈燥疾是也。皆不治。若脈浮數。表證尤在。可再汗之。若脈沉實。則爲胃實。又從汗下之。後復熱者。同此法。再汗、用桂枝湯。再下、用承氣湯。

拂鬱

拂鬱者。陽氣蒸越。形於頭面體膚之間。衆赤而不散。

瘾疹

痓痙者。痓則急而縮。痙則緩而伸。熱則生風。風主乎動。故筋脈相引而伸縮。傷寒至於痓痙。可謂危矣。能以祛風蕩熱之劑。減其大勢。間有可治者。治法與痙同。

戰慄

戰慄者。陰陽爭戰。故身爲之搖也。邪氣外與正氣爭。則爲戰。邪氣內與正氣爭。則爲慄。戰者正氣勝。故有得汗而解者。慄則不戰而但鼓頷。遂成寒逆。此陰氣內熱。正不勝邪。宜姜附四逆湯。加灼艾以禦之。經曰。陰中于邪。必內慄也。又云。邪中下焦。陰氣爲慄。足膝逆冷。便溺妄出。皆此類耳。方在惡寒條。四逆湯。甘草乾姜湯。若復燥而不得臥者。不治。

時行兩感

時行者。春應煖而反大寒。夏應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。此非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼之病多相似者。此卽時行之氣。春感寒邪在肝。升麻葛根解肌湯。夏感寒邪在心。調中益氣湯。射香湯。半夏桂枝甘草湯。秋感濕邪在肺。白虎加蒼朮。發黃茵陳五苓散。冬感寒邪在腎。名曰冬溫。括蔞湯。溫疫通用人參敗毒散。升麻葛根湯。從春分以後至秋分節前。天有暴寒者。皆爲時行寒疫。宜用辛溫藥發散。

傷寒兩感。半屬于陰。半屬于陽。臟腑俱受病。一日太陽少陰俱病。則頭疼口乾。煩滿而渴。二日陽明太陰受病。則腹滿身熱。不欲食。譫語。三日少陽厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥。水漿不入口。不知人者。六七日死。

長沙無治法。但凡兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。後人以意消息。謂如下利不止。身體疼痛。當先救裏。與四逆湯。清便自調。與桂枝湯。然治有先後之說。

太陽先受病在表。先解表。少陰先受病在裏。先救裏。先表者。裏不可緩也。先裏者。表亦不可緩也。此通權變之論也。

不得眠

陽盛陰虛。則晝夜不得眠。蓋夜以陰爲主。陰氣盛則日閉而臥安。若陰爲陽所勝。則終夜煩擾而不得眠也。所謂陰虛則夜爭者。是也。汗出鼻乾不得臥。則邪在表也。若胃有燥屎。與大熱錯語。反大汗。胃中汁乾而不得臥。則爲邪在裏也。胃不和。則臥不得安。故宜散熱和胃。若汗吐下後。虛煩不得眠。又從梔子豉湯以湧之。至于少陰病。熱煩于內而不得眠。又宜扶陰散熱。若瘥後不得眠者。則熱氣與諸陽相併。陰氣未復也。有汗下太過。陽氣暴虛而不得眠者。若無熱證。又宜□附湯。以退陰復陽也。此又不可不知。

太陽病二三日。不能臥。但欲起。心下結。脈微弱者。此本有寒。今反下之。若利止。必結胸。未止。三四日復下。必協熱而利。結胸、理中丸。協熱而利、白頭翁湯。

少陰利下欬而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯。此停水也。若二三日心煩不得眠。黃連阿膠湯。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱喘冒。不能臥者。有燥屎也。大承氣湯。

下之後復發汗。晝則煩燥不得眠。夜則安靜。不嘔不渴。無表裏證。脈沉微。身無大熱者。乾姜附子湯。

吐下汗後。心中懊憹虛煩。不得眠。梔子豉湯。陽勝陰。則狂眠亂夢。心煩乏氣者。酸棗湯。陰勝陽。則驚悸昏沉。大熱乾嘔呻吟錯語。不得眠。犀角解毒湯。中風汗出。脈濡而弱。厥而且寒。燥不得眠。小建中湯。煩燥竹葉石膏湯。

瘧後飲酒。煩惡乾嘔。口燥。呻吟錯語。不得眠。犀角解毒湯。

發斑

大熱則傷血。血熱不散。裏實表虛。熱氣乘虛出于皮膚而爲斑也。輕則爲疹子。甚則爲錦紋。或病本屬陽。誤投熱藥。或當汗不汗。當下不下。或汗下未解。皆能致此。大抵有兩證。一者溫毒。卽春時發汗下不解。邪氣不散。故發斑也。一者熱病。卽冬時溫煖乖戾之氣。遇春暄熱而發斑也。不可誤汗。若發其汗。重令開泄。更加斑爛也。然而斑之方萌。如蚊跡類焉。發斑多見于胸腹。蚊跡只在于手足。陽脈洪大。病人昏憒。先紅後赤者斑也。脈不洪大。病人自靜。先紅後黃者。蚊跡也。其或大便自利。拂鬱氣短。燥屎不通。又如果實醬者。雖盧扁復生。亦不能施其巧。凡汗下不解。煩悶。咳嗽。嘔吐。足冷不溫。便是發斑之候。

溫毒發斑。黑膏主之。渴而心悶。下利嘔吐。下部有瘡。或口瘡。黃連橘皮湯、葛根湯、橘皮湯。陽毒發斑。狂顛妄言。面赤咽痛。身斑如錦。下利赤黃。升麻湯、麥奴丸。有下證。調胃承氣湯。

時氣發斑。大青四物湯、猪膽雞子湯。

發斑通用升麻湯、犀角地黃湯。

熱多者。玄參升麻湯、黃連一物湯、青木香一物湯。

凡赤斑五死一生。黑斑不救。

動氣

動氣者。臟氣不調。築築跳動。隨臟所主而形見於臍之左右上下也。難經各藏載之。又有眞氣內虛。水結不散。氣與相搏。卽發奔豚。以其從氣衝突。如豚之奔。皆不宜汗下。然而獨不言脾。當臍之有動氣者。脾爲中州。以行津液。妄施汗下。必先動脾。是以不言而喻也。左右上下不宜汗下。何況中州之氣。其敢輕動之乎。傷寒所以看外證爲當者。蓋不在脈之可見。必待問之可得。發汗下其可輕舉哉。

動氣通用理中湯去白朮加桂。白朮燥腎閉氣。故去之。桂泄奔豚。加之。一法用柴胡桂枝湯。亦良。二方當看有熱無熱。動氣在左。發汗則頭眩。汗下不止。筋惕內瞤爲逆。先宜防風白朮牡礪湯。汗必與建中湯。動氣在右。發汗則衄而渴。心若煩。飮則吐。先宜五苓散。後與竹葉石膏湯。

動氣在上。發汗則氣上衝心。桃根湯。動氣在下。發汗則心中大煩。骨節疼痛。目暈。食入卽吐。先宜大橘皮湯。後與小建中湯。動氣在左。不可下。下之則腹滿拘急。身雖熱。反欲拳。先宜甘草乾姜湯。後與小建中湯。動氣在左下之則津液竭。咽乾鼻燥。頭眩心悸。宜竹葉石膏湯。動氣在上下之則腹滿滓穀。心痞頭眩。宜甘草瀉心湯。

蛔厥狐惑

蛔厥屬厥陰。病人素有寒。妄發其汗。或汗後身有熱。又復汗之。以致胃中虛冷。飢不欲食。食卽吐蛔而乍靜乍煩者。蛔或上而或下也。蟲聞食臭必出。所以食卽吐蟲也。蛔厥先用理中丸。次用烏梅丸。若誤下之。利不止。用四逆湯。

狐惑失匿。皆蟲證也。蓋腹中有熱。入食無多。腸胃空虛。故三蟲求食而食人之五臟也。其候。四肢沉重。惡聞食氣。默默欲眠。目不能閉。嚙齒晦面。眉間赤白黑色。變易無常。蟲食下部爲狐。下唇有瘡。其咽乾。蟲食其臟爲惑。上唇有瘡。其聲啞。治匿通用桃仁湯、黃連犀角湯、雄黃銳散。無陽者。用金液丹。厥陰爲病。消渴。氣上衝心。飢不欲食。食卽吐蚘。曰胃寒。復有消渴之證。蓋染其上焦而中焦則但寒無熱矣。又有大便難一證。並用理中湯加大黃。入蜜少許。微利之。

百合病

百合者。百脈一宗。舉身皆受病。無復所謂經絡傳次也。大病虛勞之後。臟腑不平。變而成此。其狀似寒無寒。似熱無熱。欲食不食。欲臥不臥。欲行不行。口苦便赤。藥入卽吐利也。其脈微數。每尿則頭痛。六十日愈。頭痛者。但淅淅然惡寒者。四十日愈。若尿則快然但頭眩者。二十日愈。百合知母湯、百合地黃湯、滑石代赭湯、雞子湯、百合洗方。可選用之。

不仁

不仁、謂不柔和也。經曰。諸虛承寒。則爲鬱冒不仁。蓋其血氣虛少。不能週流於身。是爲邪氣所伏。故肌體

頑麻。不知痛痒。寒過厥如尸而鬱且冒也。設或脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。又此爲命絕也。

經曰。少陰脈不至。腎氣微。精血少。寒氣上奔。血結心下。陽氣退下。熱歸陰。肱與陰相動。人之身不仁。此爲尸厥。以鬱冒不仁爲可刺之而得痊者。實神醫之診也。甘草乾姜湯、桂枝芍藥湯加乾姜桂枝麻黃各半湯。宜消息選用之。

霍亂

霍亂者。上吐下利。揮霍而撩亂者。是也。邪在上焦。吐而不利。邪在下焦。則利而不吐。邪在中焦。既吐且利。然胃氣爲邪氣所傷。陰陽乖隔。遂上吐而利也。乃謂霍亂。其餘但稱吐利者。有以異也。故以乾霍亂死者多。濕霍亂死者少。吐利則所傷之物得以泄出。胃中水穀盡也。其證則有異焉。大便硬而氣短者。實也。汗下後而得噦者。虛也。當詳究之。

太陽初得病。發汗不徹。併于陽明。續自微汗出。面色赤者。陽氣拂鬱也。解肌湯。

或汗久不徹。其脈浮緊。與麻黃湯。

小便不利。時有微熱。大便乍難。拂鬱不得臥。此燥屎裏實也。承氣湯主之。

汗下後虛熱。又復下之。其人拂鬱復與之水。因而成噦。此胃中寒也。桂枝人參湯。加茯苓。

痓後昏沉

傷寒瘥後半月以來十餘日終不惺惺錯語少神或寒熱似瘧或潮熱頰赤醫以風溫治之非也是由發汗不透寒熱在心包絡間也

瘥後昏沉不醒知母麻黃湯取微汗胃脘有熱虛煩而嘔竹葉石膏湯加生姜嘔吐不已隔上有寒理中丸

瘥後從腰以下有水牡礪澤瀉散

產後日暮微煩以其病方瘥強與穀食不消也損穀則愈矣

傷寒四證類玄出指掌圖

痰證

外證增寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息但身不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼脈有寸浮者亦有寸伏者以意參之柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯氣上衝者瓜蒂散吐之

傷食

亦頭疼惡寒身熱但左手脈平和右手脈緊盛知爲食也大橘皮湯二陳陽心腹滿痛大柴胡湯下之胸滿嘔吐瓜蒂散吐之

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛爲異耳表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有

熱不可攻。

腳氣

傷寒傳足不傳手。所以寒濕之氣發于足。則頭傷寒。其證頭疼身熱。肢節痛。大便祕或嘔。但初病時起于腳膝屈弱不能移動爲異耳。感於寒所患必冷。越婢小續命湯入生姜汁最妙。感於暑所患是熱。小續命去附子。減桂一半。腳腫木瓜散、檳榔散。大便祕脾約丸。

小便自利

太陽身黃。小便當不利。今反自利。其人如狂。血證也。抵當湯。

傷寒有熱。小腹滿。應小便不利。今反自利。爲有血也。抵當丸下之。尿血。延胡索湯。

延胡索　朴硝二兩

爲末。每服四錢。水一盞。煎八分。溫服。

陽明自汗。應小便不利而反自利。津液內竭也。屎雖硬不可攻。宜蜜導煎猪膽汁法。

少陰四逆。小便自利。虛寒也。四逆湯。及眞武湯去茯苓。小便祕或赤。知內有熱也。小便自利。其人如狂。小腹滿。知不爲熱。乃畜血也。若陽明津竭自利。與夫少陰自利。乃胞寒不禁。可不溫乎。

熱入血室

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除。脈遲身涼。胸脅滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室。當

刺期門。隨其實而瀉之。

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣及上中二焦。必自愈。

婦人中風七八日。續得寒熱發作。經水適斷。此爲熱入血室。其血必結。故如瘧狀。小柴胡湯。

陽明下血譫語。此爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。濈然汗出而愈。

婦人熱入血室有二。經水適來二條。不言藥者。蓋以經血方來。熱氣乘虛而入。經血止則熱亦出矣。故不可用汗下藥。犯其胃氣及上中焦。如其胸滿譫語。此內實也。刺期門以瀉之。若經水適斷。續得寒熱。其血必結。故用小柴胡湯。若陽明熱入血室。此男子失血之證。但當刺以瀉熱也。



殺車槌法

陶華述

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

殺車槌法

明　餘杭節菴陶　華述

吾專傷寒。深明奧旨。脉正則道合神機。用藥則隨手取應。的本續論。全備發明。殺車槌法。世之罕有。永爲養生之寶矣。今將祕驗三十七方就註三十七槌法。二十條煎法。二十條劫病并製解法。名殺車槌也。實爲我肺腑不傳之妙。我後子孫。一字不可輕露。莫與俗人言。莫使庸醫見爾。宜謹愼珍藏。毋違我之致囑也。

劫病法

一、傷寒發狂奔走。人難制伏。先於病人處生火一盆。用醋一碗傾於火上。其煙冲鼻入內。卽安。方可察其陽狂陰燥。親切用藥無差。若初起頭疼、發熱、惡寒方除。已後。登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。罵詈叫喊。大渴欲死。脉來有力。乃因邪熱傳裏。陽盛發狂。當用寒藥下之。此爲陽狂。凡見舌卷、囊縮者不治。若病起無頭疼。身微熱。面赤戴陽。煩燥。脉來沉微無力。欲坐臥於泥水中。乃因寒熱而發燥。卽陰證似陽。當用熱藥溫之。此爲陰燥。凡見厥冷、下利、譫語者不治。醫者不看脉。以虛陽上脇而燥。誤爲實熱。反與涼藥。使渴盛燥急。則氣消成大害矣。須詳脉來有力無力。此爲良法。

傷寒腹中痛甚。將涼水一盞。與病人飲之。其痛稍可者。屬熱痛。當用涼藥清之。清之不已。而或遶臍硬痛。

大便結實。煩渴。屬燥屎痛急。用寒藥下之。若食積痛。同治法。若小腹硬痛。小水自利。大便黑。身目黃者。屬蓄血痛。亦用寒劑加行血藥下盡黑物。則愈。此三者。皆痛隨利減之法也。

若飲水愈加作痛。屬寒痛。當用溫藥和之。和之不已。而或四肢厥冷。腹痛。嘔吐瀉利。急用熱藥救之。須詳脉來有力無力。此爲良法。

傷寒直中陰經。眞寒證。甚重而無脉。或吐瀉脫元而無脉。將好酒姜汁各半盞。與病人服之。其脉來者可治。當察其陰用藥。不拘脉浮沉大小。但指下出見者生。如用此法。脉不至者必死。又當問病人有何疼痛處。若有痛證。要知痛甚者脉必伏。宜隨病制宜。如無痛證。用此法而脉至者。此爲吉兆。尤當問病人。若平素原無正取脉。須用覆手取之。脉必見也。此屬反關脉診法。與正取法同。若平素正取有脉。後因病診之無脉者。亦當覆手取之。

取之而脉出者。陰陽錯亂也。宜和合陰陽。如覆取正取俱無脉者。必死矣。此爲良法。

一、傷寒舌上生胎。不拘滑白黃黑。俱用井水浸青布片。於舌上洗淨後。用生姜片子時時浸水刮之。其胎自退。凡見舌生黑胎芒刺者。必死。此熱毒入深。十有九死。是腎水尅心火也。若發黃者。用生姜時時週身擦之。其黃自退。若心胸脇下有邪氣結實。滿悶硬痛。又法用生姜一觔。搗渣去汁。炒微燥帶潤。用絹包。於患處款款熨之。稍可。又將渣和均前汁。炒乾再熨。許久。豁然寬快。俱爲良法。

一、傷寒鼻衄成流。久不止者。將山梔炒黑色爲細末。吹入鼻內。外將水紙搭於鼻沖。其血自止。若點滴不

成流者。其邪在經未解。照後祕方用藥。不在此法。

一、傷寒熱邪傳裏。服轉藥後。鹽炒麩皮一升。將絹包。於病人腹上款款熨之。使藥氣得熱則行。大便易通矣。

一、傷寒吐血不止。用韭汁磨京墨呷下。其血見黑必止。如無韭汁。用鷄子清亦可。正謂赤屬火而黑屬水也。

一、傷寒直中陰經。眞寒證。或陰毒證。身如被杖。腹中絞痛。嘔逆。沉重不知人事。四體堅冷如石。手指甲唇青。藥不得入口。六脉沉細。或無脉。欲絕者。將葱縛一握。切去根葉。取白三寸許。搗如餅。先用射香半分。填於臍中。後放葱餅臍上。以火熨之。連換二三餅。稍醒。灌入生姜汁煎服。回陽救急湯。如不醒。再炙關元氣海二三十壯。使熱氣通其內。逼邪出於外。以復陽氣。如用此法。手足温和。汗出卽醒者。爲有生也。如用此法。手足不温。汗不出。不省人事者。必死也。此爲良法。

一、傷寒熱病。熱邪傳裏。亢極無解。用黃連煎水一盞。放井中頓冷。浸青布。搭在胸中。徐徐換之。待熱勢稍退卽除。不可久漬。夏天用此法。冬天不宜用。

一、傷寒服藥轉吐出不納者。隨用竹管重捺內關後。將生姜自然汁半盞熱飲。其吐卽止。大凡服寒藥熱飲。熱藥寒飲。中和之劑温和服之。如要取汗。雖辛甘之劑。亦宜熱服。如要止汗。雖辛甘温之劑。亦宜温服。此爲良法。

一、中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末撚紙燒煙沖入鼻中有噓可治隨用吐痰法將皂莢末五分半夏白礬各三分爲細末姜汁調服探吐後服導痰湯加減治之無噓不可治此爲良法

一、治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分鹽一撮調服探吐莫與米湯設若與之即死是穀氣反助邪氣也

一、中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理中飲爲效如不飲酒人止用姜汁灌之依法調治此證冬月甚有之餘月幾希矣

製藥法

一、用附子去皮臍先將鹽水姜汁各半盞用沙鍋煮七沸後入黃連甘草各半兩再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一晝夜取出曬乾以備後用庶無毒害頂圓臍正一兩一枚者佳此爲良法

一、用川大黃須錦紋者佳剉成飲片用酒拌均燥乾以備後用不傷陰血如年壯實熱者生用不須製之此爲良法

一、用麻黃去節先滾醋湯略浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒腠理至密當生用者不須製之此爲良法

一、用茱萸將鹽水拌均炒燥以備後用庶無小毒此爲良法

解藥法

一用附子後身目紅者乃附毒之過用蘿蔔搗水濾汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分飲之以解附毒其紅即除如解遲必血從耳目口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可此爲良法如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可也

一用大黃後瀉利不止者用烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參炒白朮各半兩用附子皮一錢半甘草一錢升麻少許燈心一握水二大鍾去滓後入炒陳壁土一匙調服即止取土氣以助胃氣也此爲良法

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡礪藁本防風各一兩研爲細末遍身撲之隨後祕方用藥免致亡陽而死爲良法

煎藥法

一用發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎

一用止汗藥先煎桂枝一二沸後入餘藥同煎

一用和解藥先煎柴胡一二沸後入餘藥同煎

一用下藥先煎滾水入枳實一二沸後入餘藥同煎

一用温藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎

一、用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎。
一、用利水藥先煎猪苓一二沸後入餘藥同煎。
一、用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎。
一、用消渴藥先煎天花粉一二沸後入餘藥同煎。
一、用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎。
一、用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎。
一、用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎。
一、用發狂藥先煎石膏一二沸後入餘藥同煎。
一、用嘔吐藥先煎半夏一二沸後入餘藥同煎。
一、用勞力感寒藥先煎黃耆一二沸後入餘藥同煎。
一、用感冒傷寒藥先煎羌活一二沸後入餘藥同煎。
一、用暑證藥先煎香薷一二沸後入餘藥同煎。
一、用風病藥先煎防風一二沸後入餘藥同煎。
一、用腹如雷鳴藥先煎煨生姜一二沸後入餘藥同煎。
一、用濕證藥先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎。

祕用三十七方就註三十七槌法。

升麻發表湯　卽麻黃湯自有加減法。

治冬月正傷寒。頭痛。發熱。惡寒。脊強。脉浮緊。無汗。爲表證。此足太陽膀胱經受邪。當發汗。以頭如斧劈身如火熾者。宜用此湯

麻黃　桂枝　甘草　杏仁

升麻　川芎　防風　白芷

羌活

本經發熱、惡寒、頭痛。無汗而喘者。本方加乾葛。去升麻。

本經發熱、惡寒。身體痛者。本方加蒼朮芎藥。去杏仁。

本經惡寒發熱。身痒面赤者。以其不得小汗出故也。本方去白芷、杏仁。加柴胡、芎藥。

本經頭痛、發熱、惡寒。胸中飽悶者。本方加枳殼、桔梗。

本經感寒深重。服湯不作汗者。宜再服。至二三劑而汗不出者死。

本經汗後不解者。宜再服。量證輕重。用麻黃、升麻分多寡爲當。

水二鍾。姜三片。葱白二莖。槌法加江西豆豉一撮。煎之。熱服取汗。如神。宜厚被覆首。凡中病卽止。不得多服多則反加別病矣。

疎邪實表湯　卽桂枝湯。自有加減法。

治冬月正傷風。頭痛。發熱。惡寒。脊強。脉浮緩。自汗。爲表證。此足太陽膀胱經受邪。當實表散邪。無汗者不可服。

桂枝　赤芍藥　甘草　防風

川芎　羌活　白朮

如汗不止。如黃耆。喘。加柴胡、杏仁。

胸中飽悶。加枳殼。桔梗。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法加膠飴二匙煎之。溫服羌活沖和湯　以代桂枝、麻黃、靑龍各半等湯。此太陽經之神藥也。

治春夏秋非時感冒。暴寒頭痛。發熱惡寒。脊強無汗。脉浮緊。此足太陽膀胱經受邪。是表證。宜發散。不與冬時正傷寒同治法。此湯非獨治三時暴寒。春可治溫。夏可治熱。秋可治濕。治雜證亦有神也。祕之。不與庸俗知此奇妙耳。本方自有加減法。備開于後。

羌活壹錢半　防風壹錢　蒼朮壹錢半　黃芩壹錢　川芎壹錢

白芷壹錢　甘草壹錢　生地黃貳錢　細辛伍分不可多

如胸中飽悶。加枳殼、桔梗。去生地黃。

夏月本方加石膏、知母名神朮湯。如服此湯後。不作汗。本方加蘇葉。喘而惡寒身熱。本方加杏仁、生地黃。汗後不解。宜再服。汗下兼行。加大黃釜底抽薪之法。其春夏秋感冒。非時傷風。亦有頭痛。惡寒。身熱。脉浮緩。自汗宜實表。本方去膏朮。加白朮。汗不止。加黃耆。卽加減沖和湯。再不止。以小柴胡加桂枝、芍藥一錢。如神。

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎至一鍾。槌法加葱白搗汁五匙。入藥再煎。一二沸。如發汗。用熱服。止汗。用温服。

柴葛解肌湯　卽葛根湯本湯自有加減法。

治足陽明胃經受證。目疼。鼻乾。不眠。頭疼。眼眶痛。脉來微洪。宜解肌。屬陽明經病。其正陽明腑病。別有治法。

柴胡　乾葛　甘草　黃芩

芍藥　羌活　白芷　桔梗

本經無汗惡寒甚者。去黃芩。加麻黃。冬月宜加。春宜少。夏秋去之。加蘇葉。

本經有汗而渴者。治法開在如神白虎湯下。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法加石膏末一錢。煎之。熱服。

柴胡雙解飲　卽小柴胡湯本方自有加減法。

治足少陽膽經受證。耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。脉來弦數。屬半表半裏。宜和解。此經膽無出入。有三禁。不

可汗下吐也。止有小柴胡一湯。隨病加減。再無別湯。

柴胡　黃芩　半夏　甘草
人參　陳皮　芍藥

本經證。小便不利者。加茯苓。

本經嘔者。入姜汁、竹茹。　脇痛加青皮。

痰多加瓜蔞仁、貝母。寒熱似瘧者加桂枝。

渴者加天花粉、知母。

齒燥無津液加石膏。　嗽者加五味、金沸草。壞證加鱉甲。

本經證。心下飽悶。未經下者。非結胸。乃表邪傳至胸中。未入乎腑。證雖滿悶。尚爲在表。只消小柴胡加枳、桔。未效。就以本方對小陷胸加枳、桔。一服豁然。其妙如神。祕之不與俗人言之耳。盧煩類傷寒證。本方加竹葉、炒粳米。

本經與陽明合病。本方加葛根、芍藥。如拾芥。

婦人熱入血室。加當歸、紅花。

男子熱入血室。加生地黃。

老婦人傷寒無表證。其熱勝者。本方加大黃。甚者加芒硝。

水一鍾。姜一片。棗二枚。槌法入生艾汁三匙煎之。溫服。

桂枝大黃湯　卽桂枝湯內加大黃。本方自有加減法。

治足太陰脾經受證。腹滿而痛。咽乾而渴。手足溫。脉來沉而有力。此因邪熱從陽經傳入陰經也。

桂枝　赤芍藥　甘草　大黃

枳實　柴胡

本經腹滿。不惡寒而喘者。加大腹皮。去甘草。

水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槌法入檳榔磨水二匙。熱服。

加味理中飲　卽理中湯本方自有加減法。

治足太陰脾經受證。自利。不渴。手足溫。身無熱。脉來沉而無力。此屬臟寒。

乾姜　白朮　人參　甘草

肉桂　陳皮　茯苓

厥陰消渴。氣上衝心。飢不欲食。食卽吐蚘。腹痛。大便實者。本方加大黃蜜少許利之。

本經腹濡滿時減者。依本方去甘草。

本經嘔吐者。入半夏、姜汁。

本經跲臥沉重。利不止。少加附子。

利後身體痛者。急温之。加附子。

自利腹痛者。入木香磨姜汁調服和之。

水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槌法入炒陳壁土一匙調服。取土氣以助胃氣。

茵陳將軍湯　即茵陳湯本方自有加減法。

治足太陰脾經。腹滿身目發黃。小水不利。大便實。發渴或頭汗至頸而還。脉來沉重者。宜用。

大黃　茵陳　山梔　甘草

厚朴　黃芩　枳實

大便自調者。去大黃、厚朴。加大腹皮利小便。清爲效。水二鍾。姜一片。槌法加燈心一握煎之。熱服。

導赤散　即五苓散本方自有加減法。

治小水不利。小腹滿。或下焦蓄熱。或引飲過多。或小水短赤而渴。脉沉數者。以利小便爲先。惟汗後亡津液。與陽明汗多者。則以利小便爲戒。

茯苓　猪苓　澤瀉　桂枝

白朮　甘草　滑石　山梔

中濕。身目黃者。加茵陳。水結胸證。加木通、燈心。如小水不利而見頭汗出者。乃陽脫也。

得病起無熱但譫語。煩燥不安。精采不與人相當。此湯治之。

水二鍾、姜一片、燈心二十莖。槌法入鹽二字調服。

六乙順氣湯

以代大承氣、小承氣、調胃承氣、大柴胡、三乙承氣湯、大陷胸等湯之神藥也。舉世無人知此奇妙耳。祕之。

莫與俗人言。本方自有加減法備開。

此湯治傷寒熱邪傳裏。大便結實。口燥咽乾。怕熱譫語。揭衣狂妄。揚手擲足。班黃陽厥。潮熱自汗。胸腹滿硬。遶臍疼痛等證。悉皆治之。效不盡述。

大黃　枳實　黃芩　厚朴

甘草　柴胡　芒硝　芍藥

潮熱自汗。譫語發渴。揚手擲足。揭去衣被。狂妄。斑黃。大便實者。俱屬正陽明胃腑病。依本方。

口燥咽乾。大便實者。屬少陰。依本方。

下利純清。心下硬痛而渴者。屬少陰。依本方。

怕熱發渴。譫妄。手足乍冷乍温。大便實者。陽厥證。屬厥陰。依本方。舌卷囊縮者難治。須急下之。

譫語。發渴。大便實。遶臍硬痛者。有燥屎。依本方。

熱病。目不明。謂胃水已竭。不能照物。病已篤矣。惟宜急下。依本方。目中不了了。卽目不明也。

轉屎氣者。謂下泄也。有燥屎焉。當下之。依本方。如更衣者。止後服。不必盡劑。不更衣者。宜再少與。大便通

者愈。

結胸證。心下硬痛。手不可近。燥渴譫語。大便實者。依本方去甘草。加甘遂、桔梗。凡傷寒過經。及老弱幷血氣兩虛之人。或婦人產後。有下證。或有下後不解。或有表證尚未除。而裏證又急。不得不下者。用此湯去芒硝下之。則吉。蓋恐轉藥硝性燥急。故有此戒。大凡傷寒邪熱傳裏結實。須看熱氣淺深用藥。今之庸醫與俗醫。不分當急下可少與。宜微和胃氣之論。一槩用大黃、芒硝亂投湯劑下之。因茲枉死者多矣。余謂傷寒之邪。傳來非一。治之則殊耳。病有三焦俱傷者。則痞滿燥實堅全。俱宜大承氣湯。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以泄滿。芒硝鹹寒以潤燥軟堅。大黃苦寒以泄實去熱。病斯愈矣。邪在中焦。則有燥實堅三證。故用調胃承氣湯。以甘草和中。芒硝潤燥。大黃泄實。不用枳朴。恐傷上焦虛無氤氳之元氣。調胃之名。自此然矣。上焦受傷。則痞而實。用小承氣湯。枳實、厚朴之能除痞。大黃之泄實去芒硝。不傷下焦血分之眞陰。謂不伐其根本也。若夫大柴胡湯。則有表證尚未除。而裏證又急。不得不下者。只得以此湯通表裏而緩治之。猶有老弱及血氣兩虛之人。亦宜用此。故經云轉藥就緊。有芒硝者。緊也。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。其大柴胡加大黃、小柴胡加芒硝。方爲轉藥。蓋爲病輕者設也。仲景又云。蕩滌傷寒熱積。皆用湯液。切禁丸藥。不可不知也。

右先將水二鍾。滾三沸後入藥。煎至八分。槌法。臨時服。入鐵鏽水三匙調服。立效。取鐵性沉重之義。最能墜熱開結。有神。此千金不傳之祕。若非吾之子孫承繼。焉肯泄露玄機。故戒耳。

如神白虎湯　卽白虎湯本方自有加減法

治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用

石膏　知母　甘草　人參
山梔　麥門冬　五味子

心煩者加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥爲大忌水二鍾棗一枚姜一片煎法加淡竹葉十片煎之熱服

三黃石膏湯

此湯治陽毒發斑身黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞證表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治溫證而成此證者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其內由表未解欲發其表則裏證又急趦趄不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液榮衛不通遂成此證又治汗下後三焦生熱脉洪譫語不休晝夜喘息鼻時加衂身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識

石膏（壹兩半）　黃芩　黃連　黃栢（各柒錢）
山梔（叁拾箇）　麻黃　香豉（貳合）

水二鍾姜三片棗一枚煎法入細茶一撮煎之熱服

三黃巨勝湯

此湯治陽毒發斑。狂亂妄言。大渴叫喊。目赤。脉數。大便燥實不通。上氣喘急。舌卷囊縮。難治者。權以此湯劫之。三黃石膏湯內。去麻黃、豆豉。加大黃、芒硝是也。水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。槌法。臨服入泥漿清水二匙調服。卽安。

沖和靈寶飲

治兩感傷寒。起於頭痛。惡寒發熱。口燥舌乾。以陽先受病多者。以此湯探之。中病卽愈。

羌活　防風　川芎　生地黃
細辛　黃芩　柴胡　甘草
乾葛　白芷　石膏

水二鍾。煨生姜三片。棗二枚。槌法入黑豆一撮煎之。溫服。取微汗爲愈。如不愈。表證多而甚急者。方可用麻黃、葛根爲解表。如裏證多而甚急者。先以調胃承氣爲攻裏是也。

如以陰經自中病發熱。下利。身疼痛。脉沉細無力。不渴。倦臥昏重者。又當先救裏溫之。回陽救急湯。是分表裏寒熱而治。此其權變大法也歟。古云兩感雖爲死證。猶有可救之理。及用藥先後寒熱之劑。若發表攻裏一誤。則枉死者多矣。良可痛哉。深可惜哉。予將不傳之妙。祕驗之方。盡吐露。非惟救人有功。亦且陰隲。匪輕。謹之愼之。毋怠毋忽。

桃仁承氣對子　卽桃仁承氣湯。本方自有加減法。

治熱邪傳裏。熱蓄膀胱。其人如狂。小水自利。大便黑。小腹滿痛。身目黃。譫語。燥渴。爲蓄血證。脉沉有力。宜此湯。下盡黑物則愈。未服前而血自下者。爲欲愈。不宜服。

桃仁　桂枝　芒硝　大黃

芍藥　柴胡　青皮　當歸

甘草　枳實

水二鍾。姜三片。煎之。臨服。槌法入蘇木煎汁三匙調服。

消斑青黛飲

治邪熱傳裏。裏實表虛。血熱不散。熱氣乘於皮膚而爲斑也。輕則如疹子。重則如錦紋。重甚則斑爛皮膚。或本屬陽。誤投熱藥。或當下不下。或下後未解。皆能致此。不可發汗。重令開泄。更加斑爛也。然而斑之方萌。與蚊迹相類。發斑多見於胸腹。蚊迹只在於手足。陽脉洪大。病人昏憒。先紅後赤者。斑也。脉不洪大。病人自靜。先紅後黃者。蚊迹也。其或大便自利。拂鬱煩燥。尿不通。又如果實鬱者。盧醫復生。不能施其巧矣。凡汗下不解。足冷耳聾。煩悶欲嘔。便是發斑之候。

黃連　甘草　石膏　知母

柴胡　玄參　生地黃　山梔

犀角　青黛　人參

大便實者去人參加大黃

右水二鍾姜一片棗二枚煎之槌法臨服入苦酒一匙調服

生地芩連湯

此湯治鼻衄成流久不止者或熱毒入深吐血不止者宜用

黃芩　山梔　桔梗　甘草

生地黃　黃連　柴胡　川芎

芍藥　犀角　如無升麻代之

外用劫法水紙搭於鼻沖

如去血過多錯語失神撮空閉目不知人事者同治法

水二鍾棗二枚煎至八分槌法臨服入茅根搗汁磨京墨調飲如無茅根以藕搗汁亦可

加味犀角地黃湯

此湯治煩燥漱水不下咽者屬上焦有瘀血宜用

犀角　生地黃　牡丹皮　芍藥

甘草　桔梗　陳皮　紅花

當歸

水二鍾。姜二片。煎之。臨服。槌法入生藕節搗汁三匙。溫服。

回陽救急湯　卽四逆湯本方自有加減法。

治寒邪直中陰經。眞寒證。初病起。無身熱。無頭疼。止惡寒。四肢厥冷。戰慄。腹疼。吐瀉。不渴。引衣自蓋。踡臥沉重。或手指甲唇青。或口吐涎沫。或至無脉。或脉來沉遲而無力者。宜用。

熟附子　乾姜　人參　甘草

白朮　肉桂　陳皮　五味子

茯苓　半夏

或嘔吐涎沫。或有小腹痛。加鹽炒茱萸。

無脉者。加猪膽汁一匙。

泄瀉不止。加升麻、黃耆。嘔吐不止。加姜汁。

水二鍾。姜三片。煎之。臨服入射香三釐調服。中病以手足溫和卽止。不得多服。多則反加別病矣。如後止。可用前理中飲加減治之。無妨。

回陽反本湯

此湯治陰盛格陽。陰極發燥。微渴。面赤。欲坐臥於泥水井中。脉來無力。或脉全無欲絕者。宜用。

熟附子　乾姜　甘草　人參
麥門冬　五味子　臘茶　陳皮
面戴陽者。下虛也。加葱七莖。黃連少許。用澄清泥漿水一鍾煎之。臨服入蜜五匙。頓冷服之。取汗爲效。
柴胡百合湯
此湯治瘥後昏沉。發熱。渴而錯語失神。及百合勞復等證。
柴胡　人參　黃芩　甘草
知母　百合　生地黃　陳皮
渴加天花粉。胸中煩燥加山梔。
有微頭疼。加羌活、川芎。嘔吐入姜汁、炒半夏。
胸中飽悶。加枳殼、桔梗。
食復者加枳實、黃連。甚重。大便實者。加大黃。
胸中虛煩。加竹茹、竹葉。
瘥後乾嘔。錯語失神。呻吟睡不安者。加黃連、犀角。咳喘者。加杏仁、百合。宜加麻連。
心中驚惕爲血少。加當歸、茯苓、遠志。
虛汗者加黃耆。　脾倦加白朮。

腹如雷鳴。加煨生姜。勞復、時熱不除。加葶藶、烏梅、生艾汁。水二鍾。棗一枚。姜三片。葛法醋煮鱉甲煎之。温服。

如聖飲

治剛柔二痙。頭搖口噤。身反張。手足攣搐。頭面赤。項強急。與痿瘛同治法。

羌活　防風　川芎　白芷
柴胡　芍藥　甘草　當歸
烏藥　半夏　黄芩

有汗是柔痙。加白朮、桂枝。無汗是剛痙。加麻黄、蒼朮。口噤咬牙者。如大便實。用大黄利之。水二鍾。姜三片。煎之。臨服入姜汁、竹瀝。温服。

温經益元湯

治因汗後大虚。頭眩。振振欲擗地。幷肉瞤筋惕。及因發汗大多。衝虚亡陽。汗不止。或下後利不止。身疼痛者。併皆治之。

熟地黄　人參　白朮　黄耆
甘草　白芍藥　當歸　生地黄
白茯苓　陳皮　肉桂

如飽悶。加枳殼。去地黃。如瘦人。去芍藥。有熱去附子。利不止。加炒白朮、升麻、陳壁土。去當歸、地黃。嘔者加姜汁製半夏。渴者加天花粉。

汗後惡風寒。屬表虛。去附子、肉桂、生地黃。加桂枝膠飴。水二鍾。姜三片。棗一枚。槌法加糯米一撮煎之。溫服。

逍遙湯

治有患傷寒瘥後。血氣未平。勞動助熱。復還於經絡。因與婦人交接淫慾而復發不易有病者。謂之勞復。因交接淫慾而無病人反得病者。謂之陰陽易。予曾見舌出數寸而死者多矣。此證最難治。必宜此湯。

人參　知母　竹靑　如卵縮腹痛。倍加黃連

甘草　滑石　生地黃　菲根

柴胡　犀角

水二鍾。棗二枚。姜三片。煎之。槌法臨服入燒裩襠末一錢半調服。有黏汗出爲效。不黏汗出再服。以小水利。陰頭腫卽愈。

升陽散火湯

此湯治有患人叉手冒胸。尋衣摸床。譫語昏沉。不醒人事。俗醫不識。見病便呼爲風證。而因風藥誤人死者多矣。殊不知汗熱乘於肺金。元氣虛不能自主持。名曰撮空證。小便利者可治。小便不利者不可治。

人參　當歸　柴胡　芍藥
黃芩　甘草　白朮　麥門冬
陳皮　茯神

有痰者加姜汁、炒半夏。大便燥實。譫語發渴。加大黃。泄漏者加升麻、炒白朮。水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法入金首飾煎之。熱服。

再造散

治患頭疼發熱。項脊強。惡寒無汗。用發汗藥二三劑汗不出者。庸醫不識此證。不論時令。遂以麻黃重藥、及火刼取汗。誤人死者多矣。殊不知陽虛不能作汗。故有此證。名曰無陽證。

黃耆　人參　桂枝　甘草
熟附　細辛　羌活　防風
川芎　煨生姜

夏月加黃芩、石膏。冬月不必加。水二鍾。棗二枚。煎至一鍾。槌法再加炒芍藥一撮。煎三沸。温服。

黃龍湯

治有患心下硬痛。下利純清水。譫語。發渴。身熱。庸醫不識此證。但見下利。便呼爲漏底傷寒。而便用熱藥

止之。就如抱薪積火。誤人死者多矣。殊不知此因熱邪傳裏。胃中燥屎結實。此利非內寒而利。乃曰逐自飲湯藥而利也。直急下之。名曰結熱利證。身有熱者。宜用此湯。身無熱者。用前六乙順氣湯。

大黃　芒硝　枳實　厚朴
甘草　人參　當歸

年老氣血虛者。去芒硝。

水二鍾。姜三片。棗子二枚。煎之。後再加桔梗一沸。熱服爲度。

調榮養衞湯　卽補中益氣湯。

治有患頭疼。身熱。惡寒。微渴。濈然汗出。身作痛。脚腿酸疼。無力。沉倦。脉空浮而無力。庸醫不識。因見頭疼惡寒發熱。便呼爲正傷寒。而大發其汗。所以輕變重而害人者多矣。殊不知勞力內傷氣血。外感寒邪。宜少辛甘溫之劑。則愈。名曰勞力感寒證。故經云。勞者溫之。損者溫之。溫能除大熱。正此謂也。有下證者。大柴胡下之則緩。

人參　黃耆　當歸　生地黃
川芎　柴胡　陳皮　甘草
細辛　羌活　防風　白朮

元氣不足者。加升麻少許。須知元氣不足者。至陰之下求其升。口渴加天花粉、知母。喘嗽加杏仁。去升麻。

汗不止加芍藥去升麻、細辛。胸中煩熱加山梔、竹茹。乾嘔者加姜汁、炒半夏。胸中飽悶加枳殼、桔梗。去生地黃、甘草、黃耆、白朮少許。痰盛者加瓜蔞仁、貝母。去防風、細辛。腹痛去耆朮加芍藥、乾姜和之。其因血鬱內傷有痛處。或大便黑。加桃仁、紅花。去芍、辛羌防、黃耆、白朮。太甚者加大黃。下盡瘀血則愈。後撮本方去大黃調理。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法入葱白一莖煎之。溫服。

導赤各半湯

治患傷寒後。心下不硬。腹中不滿。大小便如常。身無寒熱。漸變神昏不語。或睡中獨語一二句。目赤唇焦。舌乾不飲水。稀粥與之則嚥。不語則不思。形如醉人。庸醫不識。而誤人者多矣。殊不知熱傳手少陰心也。心火上而逼肺。所以神昏。名越經證。

黃連　黃芩　甘草　犀角

麥門冬　滑石　山梔　茯神

知母　人參

水二鍾。姜棗煎之。加燈心一握煎沸。熱服。

益元湯

治有患身熱頭疼。全無不煩。便作燥悶。面赤。飲水不得入口。庸醫不識。呼爲熱證。而用涼藥。誤死者多矣。

殊不知元氣虛弱。是無根虛火泛上。名曰戴陽證。

熟附　甘草　乾姜　人參
五味　麥門冬　黃連　知母
葱　艾

水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槌法入童便三匙。頓冷服。

桂苓飲

治有患初得病無熱。譫語。煩燥不安。精采不與人相當。庸醫不識。呼爲狂發。誤用下藥死者多矣。殊不知此因熱結膀胱。名曰如狂證。

猪苓　澤瀉　桂枝　甘草
白朮　知母　黃栢　山梔
蒜葉

水二鍾。姜三片。煎至一鍾。槌法再加滑石末一錢。煎三沸。溫服。取微汗爲效。

當歸活血湯

有患無頭疼。無惡寒。止則身熱發渴。小水利。大便黑。口出無倫語。庸醫不識。呼爲熱證。而用涼劑。誤人多矣。殊不知內傳心脾二經。使人昏迷沉重。故名挾血如鬼祟。

當歸　赤芍藥　甘草　紅花
桂心　乾姜　枳殼　生地黃
人參　柴胡　桃仁泥
服三貼後去桃仁、紅花、乾姜、桂心加白朮、茯苓。
水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服。

加味導痰湯
有患憎寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫庸醫不識皆爲傷寒治之誤人多矣殊不知此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空空則痰生也名曰挾痰如鬼祟痰證類傷寒與此同治法。

茯苓　半夏　南星　枳實
黃芩　白朮　陳皮　甘草
桔梗　黃連　瓜蔞仁　人參
年力壯盛先用吐痰法次服此湯。
水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服槌法入竹瀝姜汁温服。

加減調中飲
治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣口脉緊盛但身不痛此與爲異耳經云飲食自倍腸胃乃傷輕則消化。

重則吐下。此良法也。

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草
白朮　山查　神曲　枳實
草菓　黃連　乾姜

腹中痛。加桃仁。痛甚。大便實熱。加大黃下之。去山查、草菓、神曲、乾姜。

心中兀兀欲吐者。與乾霍亂同吐法。用滾水一碗。入鹽一撮。皂莢末五分。探吐。

水二鍾。姜一片。煎之。瘧法臨服入木香磨取汁調飲。即效。

加減續命湯

治脚氣類傷寒。頭疼。身熱。惡寒。支節痛。便祕。嘔逆。脚軟屈弱。不能轉動。但起於脚膝耳。禁用補劑及淋洗。

防風　芎藥　白朮　川芎
防己　桂枝　甘草　麻黃
蒼朮　羌活

暑中三陽所患。必熱。脉來數。去附子、桂枝、麻黃。加黃芩、黃栢、柴胡。

寒中三陰所患。必冷。脉來遲。加附子。

起於濕者。脉來弱。加牛膝、木瓜。

起於風者脉來浮加獨活　元氣虛加人參少許大便實者加大黃
水二鍾棗二枚姜一片燈心二十莖煎之槌法入姜汁調之温服
芩連消毒湯
治天行大頭病發熱惡寒頭項腫痛脉洪取作痰火治之其喉痺者亦照此方治之
柴胡　甘草　桔梗　川芎
黃芩　荆芥　黃連　防風
羌活　枳殼　連翹　射干
白芷
先加大黃利去一二次後依本方去大黃加人參當歸調理
水二鍾姜三片煎至一鍾鼠黏子一撮再煎一沸槌法入竹瀝姜汁調服
六神通解散
治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用沖和湯不愈後服此湯
麻黃　甘草　黃芩　石膏
滑石　蒼朮　川芎　羌活
細辛

水二鍾。姜三片。槌法入豆豉一撮。葱白二莖。煎之。熱服取汗。中病卽止。

王雲五主編

傷寒明理續論及其他一種

述者　陶華

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

中華民國二十八年十二月初版

（本書校對者殷師竹潘同曾）

G一六二二上　徐鎮

萬有文庫第二集一千種

傷寒明理續論及其他一種

每冊實價國幣壹角伍分